

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

토코페롤아세테이트(KP)(비타민E로서 500IU)	500mg
산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 150.78mg)	250mg
벤포타아민(KP)(티아민염산염으로 15.91mg)	22mg
티아민질산염(KP)	30mg
피리독신염산염(KP)	50mg
감마오리자놀(KP)	10mg

【효능·효과】

■ 다음 경우의 비타민 E, B1, B6의 보급

- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
- 비타민E(토코페롤아세테이트): 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화: 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
- 비타민B1(티아민질산염): 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 각기, 눈의 피로
- 비타민B6(피리독신염산염): 다음 증상의 완화: 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

【제조사】 동방에프티엘(주) / 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 78

【판매원】  유힌메디칼 충청북도 청원군 연구단지로 219

【사용상 주의사항】 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오. 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 2) 만 12개월미만의 젖먹이 3) 심한 증상의 신부전 환자 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오. 1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파 3. 다음과 같

은 사람 경우는 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 3) 심장·순환기계기능 장애 환자 4) 신장(콩팥)장애 환자 5) 저단백혈증 환자 6) 임부 7) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질 혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오. 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 위부 불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 붉은 반점, 부전수축성 장벽동정지, 중추신경계 기능저하 2) 이 약의 투여에 의하여 생기가 예정보다 빨리 지나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다. 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관막힘)의 위험이 증가될 수 있습니다. 4) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다. 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여(함께 복용)시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오. 7) 우발적으로 과량복용 한 경우 8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오. 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전 후에는 피하십시오. 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자가 이 약을 복용할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 복용을 적절히 조절해야 합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 뭄 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오. 8 806805 006528