

규격 : 115*235
재질 : 모조지 70g
접지 : 미접지

에스린정

S-lin Tab.

조 제 용	
KGMP	일반의약품

0870108

※ 의약품을 사용하기 전에 본 문서를 자세히 읽어보시고 의약품과 함께 보관하십시오.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분 : 수산화마그네슘(KP)500밀리그램
우르소데옥시콜산(KP)10밀리그램
노회엑스(BP)..... 100밀리그램
- 기타 첨가제 : 스테아르산마그네슘, 전분, 글리콜산나트륨, 탭실드 흰색(11W1554), 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 흰색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과]

- 변비
- 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

[용법·용량]

- 만15세 이상 : 1회 1정 1일 3회(식간 또는 식후)에 복용합니다.
 - 만 11세 이상 ~ 만 15세 미만 : 1회 1정 1일 2회 아침, 저녁 공복시(식전 또는 식간)에 복용합니다.
- 복용간격은 4시간 이상으로 합니다. 다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량합니다.

[사용상의주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
- 2) 장폐색(창자막힘) 환자
- 3) 만 7세 이하의 어린이

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 마십시오.

: 제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 3) 신장장애 환자
- 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 5) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약을 복용함으로써 발진 · 충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우
- 2) 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우.
- 3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우.

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여하십시오.
- 3) 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 됩니다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[포장단위] 500정/병

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

[사용(유효)기간] 제조일로부터 36개월

[제조외의자] (주)휴비스트제약 / 대전광역시 대덕구 신일서로 104번길 46

[제조사] 한국셀슨제약(주) / 충북 음성군 금왕읍 금일로 271-8

- ▶ 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로, 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.
- ▶ 본 제품은 엄격한 품질관리를 실시한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변태, 오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ▶ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- ▶ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 의약품 정보를 참조하십시오.
- ※ 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자상담실(070-4481-6051)로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

설명서 작성일자 : 2016. 01. 12
설명서 개정일자 : 2025. 04. 16