

칼크레인정 50단위

Kalidhogenase

전문의약품
분류번호: 219

[성분·함량] 1정 중

- 유효성분: 칼리디노게나제(JP)···50.00 IU.
- 첨가제(타르색소): 황색5호알루미늄레이크(KPTaCS), 황색203호알루미늄레이크(KPTaCS)
- 첨가제(동물유래): 우수유당(소·우유), 칼리디노게나제(돼지·계장)
- 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산, 스테아르산 마그네슘, 아크릴이오올렌지(930630015), 오파드라이퀀색(OY-S-7223), 전분글리콜산나트륨, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스

[성상]

주황색 원형의 장용성 필름코팅정

[효능·효과]

1. 다음 질환에 의한 말초순환장애: 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
2. 갱년기장애, 망막락막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

[용법·용량]

1일 30~150 IU를 3회 분할하여 경구투여 한다(먹는다, 복용한다).
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 부작용
 - 1) 과민증: 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
 - 2) 순환기계: 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.



대우제약(주)

부산광역시 사하구 대일로 153 (신평동)
<http://www.daewoopharm.com>

- 3) 소화기계: 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
 - 4) 기타: 때때로 열감, 드물게 두통, 두중, 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있다.
4. 고령자(노인)에 대한 투여
일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의한다.

[저장방법 및 사용기간]

일패용기, 실온(1~30℃)보관
사용기간: 제조일로부터 24개월

[포장단위] 30정/병, 500정/병

[제조·유통] 대우제약(주) 부산광역시 사하구 대일로 153(신평동)

[제 조 자] 영풍제약(주) 인천광역시 남동구 협박외로 333

※ 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 <http://www.daewoopharm.com> 또는 051-204-3831 (대우제약 개발부)에서 확인할 수 있습니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리하에서 제조된(GMP)적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 유통 과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 사용 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 첨부문서는 의약품과 함께 보관 하십시오.

※ 정해진 용법·용량을 준수하고 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있으면 의사·약사와 상의하십시오.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.

※ 의약품통합정보시스템(<http://hedrug.mfds.go.kr>) 참조.

※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 피해구제 신청하실 수 있습니다.

작성년월일 2020. 08. 06

대우제약 소비자상담전화 (서울)02-3477-1731 (부산)051-204-3831