

티프로드 정

(티로프라미드염산염)

전문 의약품

분류번호 124

근친화성 위장관운동 정상화제

TIPROD Tablets

■ 원료약품 및 분량 : 1정 중

티로프라미드염산염 (별규) ----- 100mg

동물유래성분 : 유당수화물 (소, 우유)

■ 성 상

흰색의 원형 필름코팅정

■ 효능 · 효과

1. 다음 질환에서의 급성 경련성 동통 :
간담도 산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장 · 요관의 산통
2. 다음 질환에서의 복부 경련 및 동통 :
위장관 이상운동증, 담석증, 담낭염, 수술후 유착

■ 용법 · 용량

성인 : 티로프라미드염산염으로서 1회 100mg, 1일 2~3회 경구투여 합니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 외부 자극으로 인해 위장관이 협착된 환자
 - 2) 거대 결장, 허탈 환자
 - 3) 이 약에 과민증 환자
 - 4) 중증의 간부전 환자
 - 5) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
항콜린작용을 나타내지 않지만 녹내장 또는 전립선비대 환자에는 신중히 투여합니다.
3. 이상반응
 - 1) 구갈, 구역, 구토, 변비 등이 나타날 수 있습니다.
 - 2) 가려움, 홍반 등의 알레르기증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지합니다.
4. 상호작용
혈압강하약물을 투여받는 환자에게 이 약을 고용량 투여할 경우에는 혈압강하효과가 상승될 수 있으므로 주의합니다.
5. 임부에 대한 투여
동물실험에서 임부나 태아에 대한 이상반응을 나타내지는 않았으나 임부의 사용은 필요성이 인정되인 경우로 제한하고 의사의 감독하에 투여합니다.
6. 보관 및 취급상의 주의사항.
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의합니다.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 사용기간 : 제조일로부터 36개월

■ 포장단위 : 30정, 100정, 500정

■ 제조자 : (주)동구바이오제약, 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 18

■ 제조의뢰자 : 익수제약(주), 경기도 광주시 곤지암읍 독고개길86번길 38

670-IS-161109

본 의약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 보상받을 수 있습니다.

※ 2016년 11월 09일 이후 변경된 내용은 온라인약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하여야 합니다.

※ 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.

※ 의약품을 복용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여야 합니다.