



Mine coQVita

비타민 · 미네랄 함유 종합영양제

미네코큐비타

【원료약품 및 그 분량】

■ 유효성분 : 1캡슐(1,330 mg) 중

레티놀팔미테이트(KP)	1,471 mg
(비타민A로서 2,500 IU)	
토코페롤아세테이트(KP)	100,000 mg
(비타민E로서 100 IU)	
티아민질산염(KP)	25,000 mg
리보플라빈(KP)	12,000 mg
니코틴아미드(KP)	10,000 mg
판토텐산칼슘(KP)	10,000 mg
피리독신염산염(KP)	1,000 mg
폴산(KP)	0,100 mg
유비데카레논(KP)	10,000 mg
우르소데옥시콜산(JP)	10,000 mg
아스코르브산(KP)	70,000 mg

셀레늄함유건조효모(별규)	76,924 mg
(셀레늄으로서 100 µg)	
산화아연(KP)	31,120 mg
(아연으로서 25 mg)	
산화마그네슘(KP)	10,000 mg
(마그네슘으로서 6.03 mg)	
푸마르산철(KP)	54,760 mg
(철로서 18 mg)	
황산제이구리(EP)	1,260 mg
(구리로서 0.5 mg)	
황산망간수화물(USP)	1,540 mg
(망간으로서 0.5 mg)	
황산칼륨(KP)	5,570 mg
(칼륨으로서 2.5 mg)	

■ 기타 첨가제 : 농글리세린, 레시틴, 비결정성소르비톨액, 산화티탄, 숙산산젤라틴, 에틸바닐린, 치자 청색소, 카카오색소, 공기름, 황납

【성상】 황갈색의 내용물을 함유한 알갈색의 장방형 연질캡슐

【용법·용량】 만 8세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1캡슐 복용

【효능·효과】

1. 다음경우의 비타민 A, E, B1, B2, B6, C의 보급

- 육체피로, 임신 · 수유기, 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못보는 증상), 눈의피로

- 말초혈행장애 및 경련기시 다음 증상의 완화 : 어깨 · 목결림, 수족저림 · 수족냉증(손발이 차가움)

- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

- 각기

3. 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

4. 아연의 보급

【사용상의 주의사항】

1) 경고

(1) 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것.

(2) 철 함유제제는 만 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

(1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 (2) 만 12개월 미만의 젖먹이 (3) 고칼륨혈증 환자 (4) 일산화탄소 중독 환자 (5) 혈액소변(혈대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린 침착증, 비철결핍성 빈혈 (6) 심한 증상의 신부전 환자 (7) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 (8) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

(1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 (2) 레보도파

4) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

(1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (2) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태) (3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 (4) 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경염 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정되는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용 하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다 (4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자 (5) 심장 · 순환기계기능 장애 환자 (6) 신장장애 환자 (7) 저단백혈증 환자 (8) 당뇨병(췌관) 관련 질환, 간질환 환자 (9) 알칼리증, 소화성궤양 환자(10) 동풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자 (11) 임부 (12) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질 성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

5) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증, 성 관절부종(부기, 설사, 위부(상복부)불쾌감, 변비, 발진, 발적중합되어 붙어짐), 묽은 변, 두드러기, 광선과민반응, 복부(배부) 부종, 경련, 열, 혼수, 상복부(배부) 통증, 붉은 반점, 부전수축성 장벽동정제, 중추신경계 기능저하, 고칼륨혈증, 가스창, 위장통증, 피부염, 땀 · 호흡기 약화, 탈모, 조급증, 위장관(장자)장애, 소화장애, 저혈압, 폐부종(부기) (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정 보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다 (3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다 (4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다 (5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초 신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다 (6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고옥살산혈증(hyperursemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다 (7) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 우혈혈부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다 (8) 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈연성증) 위험을 높일 수 있다 (9) 항알도스테론제, 트리암테 렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것 (10) 우발적으로 과량복용 한 경우 (11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6) 기타 이 약의 복용 시 주의사항

(1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것 (2) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다 (3) 각종 요검사시에 혈당의 검 출을 방해할 수 있다 (4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사시에 영향을 줄 수 있다 (5) 녹차, 홍 차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것 (6) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되 는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외 배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질 제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질 제의 투여량을 감소해야 한다.

7) 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
(2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
(3) 오용/잘못 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 60캡슐(10캡슐/PTP×6), 120캡슐(10캡슐/PTP×12)

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【소비자상담실】 021834-2607

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여드립니다.

※ 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.

※ 의약품용 사용후기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 설명서 작성일자 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.meds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

설명서 작성일자 : 2019.01.31

※ 위 일자는 설명서 작성일자로 사용기한과 관련이 없습니다.

제조의뢰 · 판매자
Ym 유한메디카
서울시 영등포구 신길로 215

제조사
Rp Bio (주)알피바이오
경기도 화성시 함남읍 제약공단 4길 35-7