

비우미정

변비치료제

수산화마그네슘 500mg
우르소데옥시콜산 10mg
노회엑스 100mg

일반의약품

조제용

[원료약품 및 분량] 1정 중

· 유효성분 : 수산화마그네슘(KP)	500mg
· 유효성분 : 우르소데옥시콜산(KP)	10mg
· 유효성분 : 노회엑스(EP)	100mg
(하드록시안트라센유도체(바비론인))로서 20mg)	
· 기타 첨가제 : 포비돈, 전분글리콜산나트륨, 스테아르산마그네슘, 오파드라이한색(03B28796)	

[성상] 흰색의 장방형 필름코팅정제

[용법·용량]

- 만 15세 이상 및 성인 : 1회 1정 1일 3회 식전식간 또는 식후에 복용한다.
- 만 11세 이상 ~ 만 15세 미만 : 1회 1정 1일 2회 아침, 저녁 공복 시(식전 또는 식간)에 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다. 다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량한다.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 급성 복부질환(중수염, 장출혈, 폐양성 결장염 등 환자)
 - 정맥색 환자
 - 만 7세 이하의 어린이
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 액식물을 복용하지 말 것.
제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
 - 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 신장장애 환자
 - 다른 약물을 복용하고 있는 환자
 - 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약을 복용함으로써 발진·종혈되어 붉어진 기려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우
 - 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우
 - 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
 - 장기간 계속 사용 시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
 - 오용·잘못 사용을 먹고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 300정

- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과하였거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, '소비자 피해보상규정'에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
- ※ 의약품 부작용 피해구제신청은 한국약물관리전관(1644-6223)에 할 수 있습니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어와 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 의약품안전나라(neorug.mfds.go.kr) 또는 031)314-0329(소비자상담실)에서 확인할 수 있습니다.

문안작성일 : 2020. 01. 06 (Rev. 2)

[제조/유통 및 판매자] (주)CMG제약 / 경기도 시흥시 공단1대로27번길 27

[제조자] 에이프로젠제약(주) / 경기도 화성시 양감면 두머리길 16