

엘도스인캡슐

(에르도스테인)

■ 원료약품 및 그 분량 : 1 캡슐 중

에르도스테인(별규)300.0mg

■ 성 상 : 흰색~유백색의 결정성 분말이 들어있는 상부 녹색, 하부 황색의 경질캡슐

■ 효능·효과 :

급·만성 호흡기질환에서의 점액용해 및 거담

■ 용법·용량

1일 2-3회, 1회 1캡슐씩 복용

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 동성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 동성분의 대사물이 메치오닌 대사를 방해할 수도 있으므로 간경변 환자와 시스타치오닌 합성효소(cystathionine-synthase) 결핍 환자

2. 이상반응

- 1) 사용량(1200 mg/일)보다 과투여시 발한, 현훈, 조흥이 나타났습니다.
- 2) 국내 시판 후 조사결과(조사증례수 : 캡슐제3,303명, 시럽제791명) 보고된 이상반응은 다음과 같으며, 이 약과의 관련 여부는 확실하지 않습니다. : 피로, 소화불량, 복통, 위장장애, 설사, 구토, 오심, 두통, 신물이 올라옴, 결정성 홍반, 심계항진, 안면부종, 전신부종, 가려움증, 무력감, 몽롱함, 발진

3. 상호작용

항생제, 기관지확장제(테이필린, β_2 -효능약, 기침완화제(cough sedative)등)와 병용할 수 있습니다.

4. 임부·수유부에 대한 투여

임신중, 수유부에의 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않기 때문에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부에게는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

5. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 할 것.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에 서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것.

■ 사용(유효)기간 : 제조일로부터 36개월

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온보관(1-30℃)

■ 포장단위 : 30캡슐/병, 300캡슐/병, 500캡슐/병

※ 본 의약품은 우수의약품제조관리기준을 필한 제품입니다. 첨부문서를 읽은 후 사용(유효)기한을 반드시 확인하시고 복용하여 주시기 바랍니다. 사용(유효)기한이 경과 되었거나 유통 과정 중에 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입 했을 때에는 구입한 약국이나 병의원을 통해 교환해 드립니다. (소비자상담실 : 041-951-4300)

※ 제품 개봉 시 또는 취급시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

※ 설명서 작성된 이후 변경내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보 또는 당사 홈페이지 www.globalpharm.co.kr 의 각 제품 란에 기재되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

----- 약은 어린이 손에 닿지 않게 보관해야 합니다. -----

설명서 개정일자 2017년 04월 20일

제조사



(주) 한국글로벌제약

www.globalpharm.co.kr

충남 서천군 종천면 종천공단길 32번길 26