

카보콘정

(올리카르보필칼슘)

CBC 2016.08.22-00

카보콘정

전문의약품
분류번호 : 239

【전료약품의 분량】 이 약 1정 중

올리카르보필칼슘(LSP) 625mg(칼슘으로서 125mg)

【성 상】 흰색의 반성이 있는 연한 흰색의 정방형 필름코팅정제

【효능·효과】 만성변비, 비특이성 설사, 과민대장증후군에서의 변비 보조요법 및 설사

【용법·용량】

이 약은 적어도 250 mL의 물 또는 액체와 함께 경구투여한다.

- 약을 충분한 액체 없이 복용하면 질식의 위험이 된다(사용상의 주의사항 참조).
- 성인 : 올리카르보필칼슘으로서 1회 1,250 mg 1일 1~4회 경구투여한다.
- 소아(6 ~ 12세) : 올리카르보필칼슘으로서 1회 625 mg 1일 1~3회 경구투여한다.

6세 이하의 소아는 의사와 상담할 것.

용량은 식이요법, 운동, 이전의 하제 사용 또는 변비의 종류에 따라 다양할 수 있다. 추천되는 성인 용량은 1일 1,250 ~ 2,500 mg이며 1일 5,000 mg까지 증량 가능하다. 이 약은 12 ~ 72시간 이내에 효과가 나타난다.

취침 직전에는 복용하지 않으며, 최소 1시간은 소화할 시간 후 잠자리에 들도록 한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 원인을 알 수 없는 직장 출혈 환자
- 3) 위험한 정도의 탈수증상 환자
- 4) 설하가 어려운 질환(말장, 알코올 등)이 있는 환자
- 5) 역류 위험이 있는(누워 있어야 하는 경우 등) 환자
- 6) 절정 무력증 또는 배변 무력증 환자
- 7) 급성 복부질환(복수염, 장출혈, 괴양성 결장염 등) 환자(증상을 악화시킬 수 있다.)
- 8) 장폐색 또는 장협착증 환자(증상을 악화시킬 수 있다.)
- 9) 고칼슘혈증 환자(고칼슘혈증을 조절할 수 있다.)
- 10) 신장결석이 있는 환자(신장결석을 조절할 수 있다.)
- 11) 중증의 신부전 환자(투석 환자 제외)
- 12) 신장 복통 또는 구토, 구토 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 칼슘 성취를 제한해야 하는 환자(고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.)
- 2) 항산정제 비탄닌(D) 제제를 복용 중인 환자(고칼슘혈증이 나타날 수 있다.)
- 3) 장성배당체를 투여 중인 환자(장성배당체의 작용을 강화시킬 수 있다.)
- 4) 무산성·식산증이 추정되는 환자 및 위 점막의 병력이 있는 환자가 이 약의 효과가 충분히 나타나지 않을 수 있다.)
- 5) 투석 중이거나 중증의 신부전 환자(조기에 석회화증을 조절할 수 있다.)
- 6) 이 약은 카라멜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 이상반응

- 1) 과민반응 : 발진, 가려움 등 과민반응이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.

- 2) 혈액계 : 백혈구감소
- 3) 소화기계 : 구역, 구토, 구갈, 복부팽만감, 설사, 변비, 복통, 복경
- 4) 간장 : AST 상승, ALT 상승
- 5) 기타 : 장폐색증, 분변대복, 고칼슘혈증, 부종, 두통, 오장열, 요단백
- 6) 국내에서 재상사를 위하여 6년 동안 770명을 대상으로 실시한 시판후 조사에서 복통 1회가 보고되었다.
- 7) 기타 돌발성문재500명 재상사에서 LDH 상승, 0.1% ~ 1%미만으로 γ-GTP 상승, ALP 상승, 0.7%미만으로 총 빌리루빈 상승의 이상반응이 보고되었다.

4. 일반적 주의

- 1) 물 없이 복용하면 구역경 또는 식도염 증상, 악질, 질산의 원인이 될 수 있다.
- 2) 기술통증, 구토 또는 삼키기 힘들거나 이 제품 복용 후 출근간이 있으면 투여를 중지하고 즉시 의사 또는 약사의 상담한다.
- 3) 이 약에 의한 치료는 대증요법이다.
- 4) 7일 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사의 상담한다.
- 5) 3개월 이상 장기투여가 경향이 적으므로, 장기간에 걸쳐서 투여하는 경우 충분히 관찰하여 이상이 확인되면 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 5. 상호작용
- 1) 이 약이 장 안에는 아무는 동안 다른 약물의 흡수가 저하될 수 있으므로 다른 약물을 복용해야 하는 경우 2시간 이상의 간격을 두고 복용한다.
- 2) 이 약에 함유된 칼슘에 의해 테트라사이클린계 항생제(테트라사이클린, 미노사이클린 등) 또는 퀴놀론계 항균제(노플록사신, 오피시프록사신, 토실로수록사신 등)의 흡수가 저하될 수 있으므로 2시간 이상의 간격을 두고 복용한다.
- 3) 활동성 비탄닌(제제알미칼시를, 칼시트리올 등)과 병용투여시 장관에서 칼슘 흡수를 촉진시켜 고칼슘혈증이 나타날 수 있으므로 주의한다.
- 4) 이 약과 칼슘제-아스파르트산칼슘, 유산칼슘 등)를 병용투여시 다음 사항을 유의한다.
 - 이 약에는 칼슘이 함유되어 있어 칼슘의 과잉섭취로 고칼슘혈증이 나타날 수 있다.
 - 이 약은 칼슘이 분리되어 약효를 나타내나 병용투여의 칼슘과 재결합해서 이 약의 효과가 감소할 수 있다.
- 5) 장성배당제(다크산 등)의 작용을 강화시켜 부장액 등을 유발할 수 있다.
- 6) 다음과 같이 pH를 상승시키는 약물에 의해 칼슘의 분리가 역제되어 이 약의 효과가 감소할 수 있다.
 - 프로톤펌프 억제제(오메프라졸, 란소프라졸 등)
 - H₂ 수용체 길항제(파모티딘, 라니티딘 등)
 - 제산제(수산화알루미늄·수산화마그네슘, 건조수산화알루미늄겔 등)

6. 임부에 대한 투여

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단될 경우에만 투여한다(임신 중 투여에 대한 안전성은 확립되지 않았다.).

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되지 않았다(사용경험이 적다.).

8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 신기능이 저하되어 있는 경우가 많고 고칼슘혈증이 나타나기 쉬우므로 감량하는 등 용량에 유의한다.

9. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 습기가 적은 실온에서 보관한다.
- 3) 의약품을 한때 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(~30℃) 보관

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【포장단위】 30정/병, 300정/병

【제조회사의 조야제약(주) (경상남도 함안군 함안면 공령로 318)

【제조사】 우리들제약(주) (경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50)

- ◆ 본 제품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 본 제품을 구입시 유효기한 또는 사용기간이 경과 되었거나 변질·변태 또는 오손되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환에 드립니다.
- ◆ 이 설명서의 개정일자 2016년 08월 22일 이후 변경된 내용은 본사 홈페이지(www.wooridulpharm.com) 또는 소비자상담실(080-080-421)에서 확인할 수 있습니다.
- ◆ 온라인의약품안전망(<http://drug.meds.go.kr>) 의약품 정보를 참조하십시오

의사나 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
CBC 2016.08.22-00

제조·판매자
우리들제약(주)

www.wooridulpharm.com

본사·공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50
(소비자상담실) 080-080-421