

콜리안 정

(콜린알포세레이트)

90T

■ 원료약품 및 그 분량 1정 중

□ 유효성분 : 콜린알포세레이트(KP) 400mg

□ 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

□ 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 메타규산알루미늄마그네슘, 스테아르산마그네슘, 오파드라이노락스(200F620010), 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 크로스포비돈

■ 성상 담황색의 장방형 필름코팅정

■ 효능효과

- 뇌혈관 결손에 의한 2차 증상 및 변성 또는 퇴행성 뇌기질성 정신증후군 : 기억력저하와 착란, 의욕 및 자발성 저하로 인한 방향감각장애, 의욕 및 자발성 저하, 집중력 감소

★국내임상시험결과 추가제출

■ 용법용량 콜린알포세레이트로서 1회 400 mg을 1일 2~3회 경구투여한다. 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자

2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이상반응

1) 2차적인 도파민 작용에 기인한다고 추정되는 구역이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 투여한다.

2) 소화기계 : 위염, 위질환

3) 정신신경계 : 졸음, 불면, 적개심, 신경질, 경련, 운동과다

3. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

* 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 이 약을 사용하시기 전에 반드시 본 설명서를 읽어주시기 바랍니다.

* 본 설명서를 잘 보관하여 필요한 경우 참조하시기 바랍니다.

* 의약품 부작용 피해구제신청은 한국의약품안전관리원(1644-6223) 또는 피해구제 제도 전용 상담번호(14-3330)에 할 수 있습니다

* 이 제품 설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.swpharm.com)의 제품정보 또는 식품의약품 안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 의약품검색란을 통해 확인하실 수 있습니다.

■ 저장방법 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

■ 포장단위 90정(10정/PTP포장×9)

■ 사용기한 외부포장 참조

■ 설명문안 작성일 2021.06.29

■ 제조의뢰자 성원애드록제약(주) 경기도 김포시 양촌읍 김포대로1644번길 54

■ 제조자 한국프라이머제약(주) 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

■ 판매자 한국신텍스(주) 대전광역시 동구 한밭대로 1308, 1층(용전동, 세상빌딩)

본 제품은 인습성이 있으므로 PTP포장상태로
보관 및 조제하시고, 복용할 때 개봉하십시오.



한국신텍스