

항산화제가 보강된 종합영양제
고함량 기능성 비타민 B군

베라비타 정
With Benfotiamine + Selenium



[원료약품 및 그 분량] 1정 중

■ 유효성분 :

파리독신염산염 (KP).....	50.0 mg
d-비오틴 (USP).....	0.25 mg
시아노코발라민 (KP).....	0.05 mg
토코페롤아세이트 2배산 (BP).....	20.0 mg
(비타민E로서 10IU)	
폴산 (KP).....	0.2 mg
벤포티아민 (KP).....	50.0 mg
(비타민B12로서 36.15mg)	
니코틴아미드 (KP).....	50.0 mg
판토텐산칼슘 (KP).....	50.0 mg
산화아연 (KP).....	18.7 mg
(아연으로서 15mg)	
아스코르브산과립 (별규).....	51.55 mg
(아스코르브산으로서 50mg)	
우르소데옥시콜산 (KP).....	15.0 mg
리노시톨 (KP).....	50.0 mg
리보플라빈 (KP).....	50.0 mg
콜린타르타르산염 (DAB).....	50.0 mg
셀레늄염유건조효소 (KP).....	46.3 mg
(셀레늄으로서 25μg)	

■ 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

■ 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 콜로이드성산화규소, 히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 스테아르산마그네슘, 히드로록시프로필셀룰로오스, 오파드라이II 갈색(85 F465001), 카르나우바

[성상] 갈색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 E, B₁, B₂, B₆, C의 보급

■ 육체피로 ■ 임신·수유기

■ 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시 ■ 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

1) 비타민 B₁(벤포티아민)

■ 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등)

■ 각기 ■ 눈의 피로

2) 비타민 B₂(리보플라빈), 비타민 B₆(파리독신염산염)

■ 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

3. 아연의 보급

[용법·용량] 만 12세 이상 청소년 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

2) 만 12개월 미만의 영아

3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 고옥살산뇨증(hyperoxaluria : 요 중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)

3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자

5) 심장·순환기계 기능 장애 환자 6) 신장(콩팥)장애 환자

7) 저단백혈증 환자 8) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석에 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 피부염, 땀·호흡 시 악취, 탈모, 조급증, 구토, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종(부기)

2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.

3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.

4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.

5) 파리독신을 1일 500 mg~2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.

6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상 반응이 나타날 수 있습니다.

7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손 상을 일으킬 수 있습니다.

8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

9) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.

10) 우발적으로 과량복용 한 경우

11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.

2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.

3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.

4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있습니다.

5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관 [포장단위] 60정, 120정

[제조외국] 에이프로젠제약(주) / 경기도 화성시 양감면 두머리길 16

[제조자] 알리코제약(주) / 충북 진천군 광혜원면 용소2길 21

[판매자] (주)대웅생명과학 / 서울시 송파구 삼전로 42

※ 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.

※ 개정일자(2019년 06월 14일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

☎ 소비자 상담실 (02)561-4011

※ 부작용 보고 : 한국의약품 안전관리원(1644-6223)

첨부문서 최종 개정연월일 : 2019년 06월 14일