

팜클정 250밀리그램 (팜시클로비르)

전문의약품
기타의 화학요법제(06290)

【원료약품 및 그 분량】 1정 중
팜시클로비르(염기)..... 250mg

【형상】 흰색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 대상포진 바이러스 감염증
2. 생식기포진 감염증의 치료 및 재발성 생식기포진의 억제

【용법·용량】

1. 대상포진 감염증의 치료
성인 : 팜시클로비르로서 1회 250 mg 씩 1일 3회 7일간 경구투여한다.
다. 감염 후 증상이 나타나는 즉시 치료를 시작하는 것이 바람직하다.

2. 재발성 생식기포진 감염증의 치료

성인 : 이 약으로서 1회 250 mg 씩 1일 3회 5일간 경구투여한다.
감염 후 증상이 나타나는 즉시 치료를 시작하는 것이 바람직하다.

3. 급성 재발성 생식기포진 감염증의 치료

성인 : 이 약으로서 1회 125 mg 씩 1일 2회 5일간 경구투여한다.
전구시기 또는 감염 후 증상이 나타나는 즉시 치료를 시작하는 것이 바람직하다.

4. 재발성 생식기포진의 억제

성인 : 이 약으로서 1회 250 mg 씩 1일 2회 경구투여한다. 질병자연
경과의 변화여부를 관찰하기 위해 6~12개월마다 주기적으로
치료를 중단한다.

5. 신장에 환자 : 신장에 환자에서는 이 약의 크레아티닌 청소율이
감소하기 때문에 용량조정에 신중을 기해야 하며 아들에 대한 용법
·용량은 아래와 같다.

1) 대상포진 및 재발성 생식기포진 감염증의 치료 :

크레아티닌 청소율 (mL/min/1.73m ²)	용량
30 - 59	1회 250 mg 씩 1일 2회
10 - 29	1회 250 mg 씩 1일 1회

2) 급성 재발성 생식기포진 감염증의 치료 :

크레아티닌 청소율 (mL/min/1.73m ²)	용량
30 - 59	1회 125 mg 씩 1일 2회
10 - 29	1회 125 mg 씩 1일 1회

3) 재발성 생식기포진 감염증의 억제 :

크레아티닌 청소율 (mL/min/1.73m ²)	용량
30 - 59	1회 250 mg 씩 1일 2회
10 - 29	1회 125 mg 씩 1일 2회

4) 혈청크레아티닌만 있고 있을 경우에는 다음 계산식으로 크레아티
닌 청소율을 구할 수 있다.

남자 : (체중(kg) × (140-나이)) / (72 × 혈청크레아티닌(mg/dL))
여자 : 0.85 × 남자에 대해 구해진 값

5) 혈액투석을 실시하는 신장에 환자

혈액투석 환자는 투석간격을 고려하여 48시간마다 투여하는 것이
바람직하다. 4시간 동안의 혈액투석은 이 약의 혈장 농도를 약 75%
감소시키므로 투석 후 즉시 이 약을 투여한다. 관장용량은 대상포진
환자에게는 250mg, 생식기포진 환자에게는 125mg이다.

6. 신장에 환자

만성 대상성 간질환 환자의 경우에는 별도의 용량조정이 필요치 않다.
명백한 만성 비대상성간질환 환자에 대해서는 충분한 치료경험이
없으므로, 명확한 관장용량이 설정되어 있지 않다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

① 이 약 또는 이 약의 구성성분 및 이 약의 생리활성물질인 팜시클로
비르에 과민반응의 병력이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 신장에 환자

3. 이상반응

1) 알러지성에서 두통 및 구역이 보고된 바 있으나 대개 경증 내지
중등도였고, 이와 같은 증상은 위약으로 치료받은 환자에게서도
유사한 빈도로 나타났다. 다른 모든 이상반응은 시간 후 경험에서
추가되었다. 빈도는 매우 흔함 (≥1/10); 흔함 (≥1/100, <1/10);
흔하지 않음 (≥1/1,000, <1/100); 드물게 (≥1/10,000,
<1/1,000) 매우 드물게 (≥1/10,000); 마상 (자료로부터 추정
불가능)로 표시하였다.

2) 알러지 및 림프계 : 드물게 혈소판감소증이 나타났다. 임상시험에서
는 이 약 투여군에서 위약군보다 백혈구 및 호중구 감소가 더 자주 나
타났다.

3) 정신신경계 : 매우 흔하게 두통, 흔하게 어지러움, 흔하지 않게
허란 및 졸음(특히 고령자에서 많이 나타남), 드물게 환각이 나타났다.

4) 심장계 : 드물게 심계항진

5) 소화기계 : 흔하게 구역, 구토, 복통 및 설사가 나타났다.

6) 간담도계 : 흔하게 간기능 검사 이상, 드물게 황달이 나타났다.

7) 피부 및 피하조직 : 흔하게 피부발진 및 가려움이 나타났고, 흔하지
않게 두드러기 및 혈관부종(예, 알물부종, 눈꺼풀부종, 눈주위부종,
인두부종)이 나타났다. 중증 피부반응(예, 다형성반, 스티븐스-존슨
증후군, 독성표피괴사증후군) 및 혈관파괴성혈관염이 나타났는데
자발적이고 및 문헌에서 수집된 정보이기 때문에 그 빈도는 마상이다.

8) 신장 : 신기능을 고려하여 적절히 이 약의 용량을 감소시키지 않은
신질환 환자에서 드물게 급성신부전이 보고되었다.

9) 국내 시판후 조사 결과(조사종류수 : 4,304명) 나타난 이상반응은
다음과 같으며, 이 약과의 관련 여부는 확실하지 않다. : 상복부통,
변비, 간기능 이상, 설사, 복부팽만감, 소화불량, 인두부종, 피로,
통증, 백혈구감소증, 불면, 생리기간 단축, 배뇨곤란

4. 일반적 주의

1) 이 약은 생식기포진을 완치시킬 수 없으며, 이 약 치료를 시작한
이후에도 생식기포진의 증상이 있을 때는 성적 접촉을 피할 것을
환자에게 조언해야 한다. 또한 전염의 가능성이 있기 때문에 이 약의
치료와 더불어 안전한 성관계를 가질 것이 권장된다. 재발의 첫
증상이나 증후가 보이면 바로 치료를 시작하도록 교육한다.

2) 이 약이 운전 또는 기계작업 능력에 영향을 미친다는 증거는 없다.
그러나 이 약을 복용하는 동안 어지러움, 졸음, 혼동 및 기타 중추신경계
장애를 경험한 환자들은 운전이나 기계작업을 삼가해야 한다.

3) 경미 내지 중등도의 간장애 환자는 신기능이 정상이면 특별히 용량을
조절할 필요가 없다. 중증의 간장애 환자를 대상으로 연구된 바가
없지만, 이러한 환자에서 팜시클로비르가 생리활성물질인 팜시클로비르
로 전환되지 않아 혈장 팜시클로비르 농도가 낮아서 약효가 감소될
가능성이 있다.

5. 상호작용

1) 전임상시험에서 이 약은 시트크롬 P450을 유도하거나 CYP3A4를
억제할 가능성은 없는 것으로 나타났다.

2) 이 약에 대한 다른 약물의 영향

- 알로푸리놀, 시메티딘, 테오필린, 지도부딘, 프로메타진, 제산제(그네
솔 및 수산화알루미늄) 투여 후, 혹은 엔트리타빈과 동시에 이 약 500
mg을 투여 후 시 생리활성물질인 팜시클로비르의 약동학에 임상적으
로 유의한 변화가 나타나지 않았다.

- 이 약 다량투여(1회 500mg, 1일 3회) 후 다국산을 다량 투여했을 때
팜시클로비르의 약동학에 임상적으로 유의한 변화가 관찰되지 않았다.

- 농동적 신신포로 분비에 의해 주로 배출되는 약물들(예 : 프로페네시
드) 혈장 팜시클로비르 농도를 상승시킬 수 있다. 따라서 이 약을 1회
500mg, 1일 3회 복용하는 환자가 프로페네시드를 마칠간 연속적으로
병용할 시에는 독성이 나타나지지 모니터링해야 하고, 이 약의 용량 강도를
고려할 수 있다.

- 팜시클로비르는 알데하이드산화효소에 의해 대사되므로, 이 효소를
유도/억제하거나 이 효소의 대사를 받는 다른 약과 상호작용을 일으킬
가능성이 있다. *in vitro* 알데하이드산화효소저해제인 시메티딘 및 프로메
타진과의 임상적 상호작용을 알아보는 시험에서 병용투여가 생리활성물
질인 팜시클로비르 형성에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났지만,
정확한 *in vitro* 알데하이드산화효소저해제인 라옥시벤은 팜시클로비르 형
성을 감소시킬 수 있는 것으로 나타났기 때문에 이 약을 라옥시벤과 병용
시 치료 효과를 모니터링해야 한다.

3) 다른 약물에 대한 이 약의 영향

- 이 약 500mg 투여 또는 다량투여(1회 500mg, 1일 3회)를 다국산과
병용했을 때 다국산의 약동학은 변하지 않았다.

- 이 약 500mg 단회투여를 지도부딘 또는 엔트리타빈과 병용했을 때
지도부딘, 지도부딘의 대사체인 지도부딘글루쿠로니드 및 엔트리타빈
의 약동학에 임상적으로 유의한 영향이 관찰되지 않았다.

- 이 약은 *in vitro* 에서 알데하이드산화효소를 약하게 저해하는 것으로
나타났다.

6. 임부, 수유부 및 기임여성에 대한 투여

1) 동물실험에서 이 약 및 생리활성물질인 팜시클로비르에 의해 태자독
성이나 기형발생이 나타나는 않았다. 동물실험에서는 고형의 병리조직
학적 변화가 관찰되었으나, 사람에서는 이 약을 1회 250 mg, 1일 2회
장기간 투여했을 때 남성의 정자수, 정자 형태, 운동성 등에 유의적인
영향을 미치지 않았다. 500 mg/kg를 투여한 수컷 랫드에서 생식능의
감소가 관찰되었으나, 임신 랫드와 생식능에는 의미있는 변화가 나타나
지 않았다.

2) 임신 중 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로, 임부 또는
임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 치료상의 유익성이 위험성을
상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

3) 수유부 : 젖통에 이용한 동물실험에서 이 약의 경우 투여 후 팜시클로
비르가 유즙으로 이행되는 것으로 나타났다. 사람 모유로의 이행에
대한 정보는 알려지지 않았다. 수유부에게는 치료상의 유익성이 위험성을
상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

4) 기임여성 : 기임여성에 대한 자료는 없으며 특별한 추천사항은 없다.

7. 소아에 대한 투여

18세 미만의 소아에 대한 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않으므로
투여하지 않는 것이 바람직하다.

8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에게서 용량 조정은 요구되지 않으나 신장장애가 있는
경우 용량 조정이 필요하다.

9. 과량투여시의 처리

이 약을 과량투여한 경험은 제한적이다. 과량투여 시 적절한 보조적 치료
및 대증적 치료를 실시한다. 혈액투석을 실시 할 수 있으며, 이 약의 생리
활성물질인 팜시클로비르는 4시간의 혈액투석으로 혈장농도가 75% 까지
감소될 수 있다.

10. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 30℃ 이하의 건조에 보관한다.

2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

3) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고의 원인이 되거나 품질 유지면에서
바람직하지 않으므로 주의한다.

11. 기타

알려진 용량의 약 60배를 투여한 랫드 고령량 투여군(600
mg/kg/day)에서 유선암의 발생빈도가 증가하였다. 어떤 랫드를 대상으
로 태어난 후 4월 제부터 10주 동안 매일 팜시클로비르 0, 4Q, 125 또는
400 mg/kg/day를 투여했을 때, 투여량 관련된 사망 또는 임상적
관찰은 없었다. 성숙 동물에 비해 어린 랫드에서 팜시클로비르의 독성이
증가되지는 않았다.

【저장방법】 기밀용기, 건조보관(30℃ 이하)

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 21정/병, 30정/병, 100정/병, 300정/병, 500정/병

【제조업체】 한국코코스(주)

충청북도 제천시 강서로 30

【제조자】 (주)한국비엠이

제주특별자치도 제주시 협만로7길 11

※ 외약품용 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어와 하며, 첨부문서
를 외약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인 의약품판
(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

문안작성일 : 2017.02.16