

카리노젠



50단위 (칼리디노게나제)

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분 : 칼리디노게나제(P) 50 IU
- 첨가제(동물유래) : 무수유당(소, 우유)
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 폴리메틸렌글리콜6000, 콜로이드성이산하규소, 히프로멜로오스프탈레이트

[성상] 흰색의 원형 장용성 필름코팅정

[효능·효과]

1. 다음 질환에 의한 말초순환장애 : 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
2. 경년기장애, 망맥락막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

[용법·용량]

1일 30~150IU를 3회 분할하여 경구투여 한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
2. 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 부작용
 - 1) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
 - 2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
 - 3) 소화기계 : 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
 - 4) 기타 : 때때로 열감, 드물게 두통, 두중, 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있다.

3. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

[포장단위] 30정/병, 100정/병, 300정/병, 500정/병

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[제조외국] 한국코러스㈜ / 충청북도 제천시 강저로 30

[제조자] ㈜원화 / 강원도 춘천시 동내면 거두단지2길 55

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품일 경우에는 구입처에서 교환해드립니다.

※의약품은 의사또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이 손에 닿지 않는곳에 보관하십시오.

※의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어와 하며 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

※작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※부작용 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)