

카리맥스정 (칼리디노게나제)

Karimax Tablet (Kallidinogenase)

- ※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 의약품을 사용하는 동안에는 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

유효성분 : 칼리디노게나제(JP) 50IU,
 첨가제(동물유래) : 무수유당(소, 우유)
 첨가제(타르색소) : 적색3호, 적색4호
 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 폴로이드성아산화 규소, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스프탈레이트

【성상】

적색의 원형 장용성 필름코팅 정제

【효능·효과】

1. 다음 질환에 의한 말초순환장애: 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
2. 경면기장애, 망맥락막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

【용법·용량】

1일 30~150IU를 3회 분할하여 경구투여 한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
 - 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍 증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 부작용
 - 1) 과민증: 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
 - 2) 순환기계: 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
 - 3) 소화기계: 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
 - 4) 기타: 때때로 열감, 드물게 두통, 두중, 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있다.
4. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

【저장방법】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

30정/병, 300정/병

- ※ 의약품 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(tel.1644-6223)
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다. 작성일 이후 변경된 내용은 '온라인 의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)'을 참조하십시오.

작성연월일 : 2018. 08. 10
EJ4054-00

제조사 : (주)메디카코리아
 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 96

제조외뢰자 : (주)휴온스
 충청북도 제천시 바이오밸리로 100
 소비자 상담실(반품 및 교환처) : 080-447-4700

