

오코티딘정

오사프리드시트르산염수화물



의약품을 복용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

오코티딘정

(오사프리드시트르산염수화물)

KGMP
적격업체
전문의약품

Aukotidine Tab.

분류번호 : 239

■원료약품의 분량 이 약 1정 중
오사프리드시트르산염수화물(OP)..... 529mg

(오사프리드시트르산염무수물로서 5mg)
첨가제(중량유래): 유당수화물(소-우유)

■성상
흰색의 장방형 필름코팅정

■효능·효과
기능성소화불량으로 인한 소화기증상(속쓰림, 구역, 구토)

■용법·용량
성인: 오사프리드시트르산염무수물로서 1일 15 mg를 3회로 나누어 식전 또는 식후에 경구투여한다.

■사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이상반응
998례 중 40례(4.0%)에서 이상반응이 나타났다. 주요한 이상반응으로는 설사·복통은 변(1.8%), 구강(0.5%), 권태감(0.3%) 등이 있다. 임상경사지에서는 792례 중 30례(3.8%)에서 이상반응이 보였다. 주요 내용으로는 호산구증가(1.1%), 중성지방의 상승(1.0%), AST, ALT, ALP 및 γ-GTP의 상승(각 0.4%) 등이 있다.

1) 중대한 이상반응
전격성간염, 간기능 장애와 황달(각 0.1% 미만): 전격성간염, 현저한 AST, ALT, γ-GTP의 상승 등을 동반한 심각한 간기능 장애, 황달이 나타나는 경우가 있고, 사망에 이르게 될 수도 있으므로, 충분히 관찰하고, 이상이 확인되는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 적절한 처치를 실시한다.

2) 기타 이상반응
(1) 과민반응: 발진, 두드러기, 때때로 부종
(2) 혈액계: 때때로 호산구증가, 백혈구감소
(3) 소화기계: 복부팽만감, 구강미(혀와 인두를 포함), 때때로 설사, 묽은변, 구갈, 복통, 구역, 구토, 미각이상
(4) 간장: 때때로 ALP의 상승, 빌리루빈상승, ALT 상승, 드물게 AST, γ-GTP의 상승
(5) 순환기계: 때때로 심계항진
(6) 정신신경계: 때때로 두통, 현기증, 어지럼, 취침거침, 두통
(7) 기타: 진전, 때때로 권태감, 중성지방의 상승

3) 국내 시판후 조사결과
국내에서 제1상사를 위하여 6년 동안 745명을 대상으로 실시한 시판후 사용성적조사결과 이상반응의 발현사례들은 인과관계 여부와 상관없이 1.9%(14명/745명)로 보고되었고, 이 중 이 약과 인과관계가 있는 것으로 조사된 것은 1.3%(10명/745명)이다. 이상반응은 인과관계 여부와 상관없이 복통, 설

사 각 4례, 묽은 변 3례, 구역 2례, 복부팽만, 소화불량, 유증분비과다, 권태, 발진 각 1례로 나타났다. 이 중 시판전 임상시험에서 나타나지 않았던 새로운 이상반응으로 소화불량, 유증분비과다 각 1례씩 보고되었다.

4) 외국에서의 시판후 조사결과
일본에서 실시한 시판후 사용성적조사결과 3,014례 중 74례(2.5%)에서 이상반응이 나타났다. 주요한 이상반응으로는 설사·복통은 변(0.4%), 구갈(0.3%) 등이 있다.

5) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것 의미하는 것은 아니다.

- 출혈
- 3. 일반적 주의
알정기간(보통 2주) 투여하여도 소화기 증상의 개선이 보이지 않을 경우 정기간 투여하지 않는다.
- 4. 상호작용
이 약의 소화관운동촉진작용은 골관절염 증상의 개선으로 인해 항골관절염제(비스포스 등)와 병용 투여 시 이 약의 작용이 감소될 수 있으므로 병용 간격을 두는 등 병용시 주의한다.
- 5. 임신 및 수유부에 대한 투여
1) 임신 중의 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
2) 동물실험에서 모유 중으로의 이행이 보고되어 있으므로 수유 중에는 투여를 피하고, 부득이한 경우에는 수유를 중단한다.
- 6. 소아에 대한 투여
소아 등에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 없다.).
- 7. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자에서는 신기능, 간기능 등의 생리기능이 저하되어 있으므로 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여하고 이상반응이 발현된 경우에는 강량을, 1일 7.5 mg)하는 등 적절한 처치를 한다.
- 8. 보충 및 취급상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지 면에서 바람직하지 않으므로 아를 주의한다.
- 9. 기타
설치부에 임상통상용량의 100 ~ 300배(30 ~ 100 mg/kg/일)를 정기간 경구투여한 시험(랫) 104주, 마우스 92주간에 있어 종양(간세포종종 및 갑상샘여포상종) 발생률의 상승이 나타났다.

■저장방법 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

■사용기한 제조일로부터 36개월

■포장단위 30정, 300정

■제조자 영일제약(주)/충청북도 진천군 진천읍 문화12길 6-1

■제조자의뢰자 (주)오스코리아제약/원천도 원주시 문막읍 문막공단길 252

* 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.
* 의약품 용어 및 기타 자세한 약품 정보는 온라인약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참고하세요.
* 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<https://www.drugsafe.or.kr>)-의약품 유해사례보고, 1644-6223에 알려주시기 바랍니다.

본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 소손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

작성연월일: 2016.06.01 (이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 당사의 홈페이지(www.ausk.co.kr)나 개별발(전화: 02-488-3670, E-mail: admin@ausk.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.)

AKTT-2-160601

