

기능무력증 보조치료제

레티몰액 (시트룰린말산염)

일반 의약품

분류번호 : 399



(01)08806562046805

[원료약품 및 분량] 1포(20mL) 중

- 유효성분 : 시트룰린말산염(별규) 1 g
- 기타 첨가제 : 수산화나트륨, 백당, 수크랄로스, 오렌지엡센스(#46-F), 정제수

[성상] 알루미늄 호일 파우치에 든 오렌지향이 있는 무색 내지 옅은 노랑색의 액체

[효능·효과] 기능 무력증의 보조치료

[용법·용량]

성인 : 시트룰린말산염으로서 1회 1 g, 1일 3회 복용합니다.
소아(6세이상) : 시트룰린말산염으로서 1회 1 g, 1일 2회 복용합니다.
단, 4주 이상 투여하지 않습니다.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
6세 미만의 유아
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 임부(동물실험에서 기형발생은 보고되지 않았으며 임상에서도 기형발생 또는 태자독성이 보고된 바 없으나 임신중 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임신중에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.)
 - 수유부(유즙 분비에 대한 자료가 없으므로 이 약은 수유부에게 투여하지 않는 것이 바람직합니다.)
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 지키십시오.
 - 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 복용시키십시오.
 - 드물게 투여초기에 약한 위장관 장애가 나타날 수 있습니다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

[포장단위] 1포(20mL)×36포/박스

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[제조의뢰자] (주)레고켐제약 / 경기도 안성시 원곡면 원당로 354

[제조사] (주)텔콘제약 / 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업1로 120

- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

작성일 : 2018. 02. 14. (Rev. 2)