

코감기·알레르기성 비염

그린노즈에스 시럽

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의 깊게 읽어보시고, 사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품의 분량] 100mL 중

유효성분 : 슈도에페드린염산염(USP) 300mg
 클로르페니라민말레산염(KP) 20mg
 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP) 72mg
 파라옥시벤조산프로필(KP) 8mg
 기타 첨가제 : 글리세린, 스트로베리 후레바 타-6653, 시트르산나트륨수화물, 시트르산수화물, 자일리톨, 정제수

[성상] 갈색유리병에 담긴 무색의 딸기향이 있는 시럽제

※ 소아용안전용기 (Child-Resistant Closure): 뚜껑을 누른 상태에서 시계반대방향으로 돌려주세요.

[효능·효과]

다음 증상의 일시적완화 : 눈의 가려움, 눈물, 콧물, 코 또는 인후(목구멍)의 가려움, 재채기, 코막힘 및 부비동 울혈

[용법·용량]

4~6시간마다 다음 용량을 복용하고, 24시간 동안 4회를 넘지 않습니다.

연령	체중	1회 투여량
2 ~ 6 세	11 ~ 21 kg	5mL (1티스푼)
6 ~ 12 세	22 ~ 43 kg	10mL (2티스푼)
12세 ~ 성인	44 kg 이상	20mL (4티스푼)

만 2세 미만에게 투여하지 않습니다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받습니다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

슈도에페드린 함유 의약품 복용시 급성 전신성 발진성 농포(고름물집)증(AGEF)과 같은 중증(심한증상) 피부 이상반응이 나타날 수 있습니다. 발열, 홍반(붉은 반점), 다수의 작은 농포(고름물집)와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야 합니다.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 모노아민옥시다아제 억제제(MAOI-우울증, 정신 및 감정장애, 파킨슨병 치료제 중 일부)를 투여중이거나 투여를 중지한지 2주 이내인 사람
- 2) 만약 처방약에 모노아민옥시다아제 억제제(MAOI)의 포함 여부를 모를 경우, 이 약 복용 전에 의사나 약사에게 문의하십시오.

3. 다음 환자는 복용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 심장질환, 고혈압, 갑상선질환, 당뇨병, 녹내장, 또는 천식이나 만성기관지염과 같은 호흡 장애가 있는 사람
- 2) 진정제 또는 신경안정제를 복용중인 사람

4. 복용할 때 다음 사항을 주의하십시오.

- 1) 권장량을 초과하지 마십시오.
- 2) 이 약은 특히 어린이에게 흥분상태를 유발시킬 수 있습니다.
- 3) 이 약은 현저한 졸음을 일으킬 수 있으며 진정제 및 신경안정제의 병용(함께 복용)으로 졸음효과가 상승될 수 있습니다.
- 4) 불안, 어지러움 또는 불면증이 생기면 이 약의 사용을 중지하고 의사·약사와 상의하십시오.
- 5) 증상이 7일 이내에 개선되지 않거나, 열이 나는 경우 복용을 중지하고 의사·약사와 상의하십시오.
- 6) 인후(목구멍)통이 2일 이상 지속되거나 두통, 발열, 발진, 구역 또는 구토와 같은 증상이 나타나는 경우 이 약의 사용을 중지하고 의사·약사와 상의하십시오.

- 7) 급성 전신성 발진성 농포(고름물집)증(AGEF), 발열, 홍반(붉은 반점), 다수의 작은 농포(고름물집)와 같은 중증(심한증상) 피부 이상반응이 나타날 경우 이 약의 사용을 중지하고 의사·약사와 상의하십시오.

5. 과량투여시의 처치

- 1) 부주의로 과량 복용 시, 즉시 의사·약사의 도움을 받으십시오.
- 2) 아무런 증상이 나타나지 않더라도 즉각적인 의학적 조치를 취하십시오.

6. 소아에 대한 투여

만 2세 미만에게 투여하지 않습니다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받습니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관합니다.
- 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관합니다.

[저장방법] 차광기밀용기, 25℃ 이하보관

[포장단위] 90 mL

※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상받을 수 있습니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변색, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서의 작성일자(2019년 4월 30일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.greencross.com)나 소비자 상담실(080-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.

제조업체

 **GC 녹십자**
(주) 녹십자

충북 음성군 금왕읍 무극로65번길 26
 TEL. 031)260-9300
 소비자상담실 TEL. 080-260-0033