

알피칼리정

저음의약품
KMP적격업체

말초순환장애개선치료제 (칼리디노게나제)

【원료약품의 분량】 1정(327.04mg) 중

- 유효성분
칼리디노게나제(동물유래 : 돼지췌장)(JP) 50.00IU
- 첨가제(타르색소): 황색5호알루미늄레이크, 황색203호알루미늄레이크
- 동물유래성분 : 무수유당(소, 우유)
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 모비돈, 전분글리콜산나트륨, 스테아르산, 스테아르산마그네슘, 오파드라이흰색(OYS-7223), 아크릴이조오렌지(930630015), 폴리에틸렌글리콜6000

【성상】 주황색 원형의 장용성 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 질환에 의한 말초순환장애 : 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
2. 갱년기장애, 망막혈막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

【용법·용량】

- 1일 30~150IU를 3회 분할하여 경구투여 한다(먹는다, 복용한다).
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용

- 1) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
- 2) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.
- 3) 소화기계 : 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
- 4) 기타 : 때때로 열감, 드물게 두통, 두중, 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있다.

4. 고령자(노인)에 대한 투여

일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의한다.