

전문의약품

분류번호:124

진경제·위장관기능운동 정상화제

티로핀 정

(티로프라미드염산염)

■ 원료약품 및 그 분량: 1정 중

주성분: 티로프라미드염산염(별규).....100mg

첨가제(동물유래): 유당수화물(소, 우유)

■ 성상: 흰색의 원형 필름코팅정**■ 효능·효과:**

1. 다음 질환에서의 급성 경련성 동통: 간담도산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장·요관의 산통
2. 다음 질환에서의 복부 경련 및 동통: 위장관 이상운동증, 담석증, 담낭염, 수술 후 유착

■ 용법·용량:

- 성인: 염산티로프라미드로서 1회 100mg 1일 2-3회 경구투여한다.
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항:

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 외부 자극으로 인해 위장관이 협착된 환자
 - 2) 거대 결장, 허탈 환자
 - 3) 이 약에 과민증 환자
 - 4) 중증의 간부전 환자
- 5) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
항콜린작용을 나타내지 않지만 녹내장 또는 전립선비대 환자에는 신중히 투여한다.
3. 이상반응
 - 1) 구갈, 구역, 구토, 변비 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 가려움, 홍반 등의 알레르기증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
4. 상호작용
혈압강화약물을 투여받는 환자에게 이 약을 고용량 투여할 경우에는 혈압강화효과가 상승될 수 있으므로 주의한다.
5. 임부에 대한 투여
동물실험에서 임부나 태아에 대한 이상반응을 나타내지는 않았으나 임부의 사용은 필요성이 인정되는 경우로 제한하고 의사의 감독하에 투여한다.
6. 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것.

■ 포장단위: 30정, 500정**■ 저장방법: 밀폐용기, 실온보관(1~30°C)****■ 제조회사/판매자: 일성신약(주), 경기도 안산시 단원구 산단로 349****■ 제조자: 영풍제약(주), 인천광역시 남동구 함박로 333(남촌동)**

※의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.

※첨부문서에 기재되어 있지 않은 부작용이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 식품의약품안전처에 알려십시오.

※사용(유효)기한이 경과한 의약품은 사용하지 마십시오.

※본 의약품은 KGMP의약품 제조 및 품질관리기준에 의하여 엄격한 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)

기한이 경과되었거나 변질·변태·오염되거나 손상된 의약품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※이 첨부문서 작성 연월일 이후 변경된 내용은 www.ilsung-ph.co.kr 이나 소비자상담실(수신자부담) 080-211-0003을 통해 확인할 수 있습니다.