

물없이 먹는 멸미약

멀스도 구강
용해
필름

메클라진 염산염수화물

「일반의약품」

분류번호 235

■ 원료약품의 분량 : 이 약 1매 중

메클라진염산염수화물(USP) 25.00mg

■ 성상 : 옅은 노란색의 직사각형 구강필름형 제제

■ 효능 · 효과 : 멀미에 의한 어지러움 · 구역 · 구토의 예방 및 완화

■ 용법 · 용량

12세 이상 청소년 및 성인:

1일 1회 1~2매를 혀 위에 놓고 녹여서 복용한다. 녹은 후에는 입안에 머금지 않고, 바로 삼키도록 한다.

멀미의 예방에는 승차 1시간 전에 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 임부, 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 또는 수유부
- 2) 디메넨메탄게 약물(디멘하이드레미트, 염산메클라진, 염산부클리진 등)에 과민증 환자
- 3) 협우각형 녹내장 환자
- 4) 전립선비대 등 배뇨장애 환자
- 5) 12세 미만의 소아

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 알코올, 진정제, 정신안정제(졸음 증상을 증가시킬 수 있다.)
- 2) 다른 진통제, 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진해거담제
- 3) 모노아민산화효소(MAO) 저해제(이 약의 항콜린 작용을 연장시켜 약효를 증강시킬 수 있다.)

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 약으로 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
- 2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 3) 천식환자, 폐기종 혹은 만성 기관지염과 같은 호흡기 질환을 앓고 있는 환자
- 4) 12세 이상 청소년(다른 항히스타민제와 같이 소아에서 과잉흥분을 일으킬 수 있다.)
- 5) 고령자(일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감당하는 등 주의한다.)

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
어지러움, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 배뇨(소변을 놓) 어려움 및 구강(입안) 건조증상의 증가 혹은 지속 증상이 있을 경우.

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것
- 2) 이 약을 투여중인 환자는 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
- 3) 이 약을 복용하는 동안 알코올 음료를 마시지 말 것

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

■ 저장방법 : 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관 (사용기간 : 제조일로부터 36개월)

■ 포장단위 : 2매 (1매/알루미늄호일포장×2)

■ 첨부문서 최종 개정일 : 2016년 6월 20일

■ 제조의뢰자 : 고려제약 주식회사

■ 제조자 : (주)씨티씨바이오, 경기도 안산시 단원구 강촌로 228-16

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용 기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 의품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.
※ 기타 문의사항은 의 · 약사와 상의하거나 당사의 소비자 상담실
080-529-6100로 문의하십시오.
※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은
<http://www.nicepharma.com>에서 확인하실 수 있습니다.

16-5-30



고려제약주식회사

경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10