

효과빠른!! 알레르기제

알러엔

연질
캡슐

(세티라진염산염 10mg)

일반의약품
분류번호: 01410

알레르기성비염 / 알레르기성결막염 / 두드러기 / 피부가려움증

【성분·함량】 1캡슐 중

세티라진염산염(BP) 10.0mg

첨가제(KPTaCS) : 적색40호, 적색3호, 청색1호

첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(소, 가축)

【성상】

미황색 투명한 액상 내용물이 든 보라색 타원형 연질캡슐

【효능·효과】

계절성 및 다년성 알레르기성 비염(코염), 알레르기성결막염, 만성 특발성(원인불명의) 두드러기, 피부 소양증(가려움증)

【용법·용량】

1. 성인 및 6세 이상의 소아 : 세티라진염산염으로서 1일 1회 10mg 취침 전에 경구투여한다(먹는다, 복용한다). 2. 이상반응에 민감한 환자의 경우는 5mg씩을 아침, 저녁에 투여한다. 3. 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다. 4. 중등도 ~ 중증(심한 증상)의 신장에(신장(콩팥)장애) 환자 : 투여 간격은 환자의 신기능에 따라 조절되어야 한다. 다음 표를 참조하여 용량을 조절한다. 이 용량 표를 사용하기 위해서는 mL/min 단위의 크레아티닌 청소율(C_{Cr})이 필요하다. C_{Cr} (mL/min)은 다음 공식을 이용하여 혈청 크레아티닌 (mg/dL) 측정치로부터 계산된다.

$$C_{Cr} = \frac{[140 - \text{연령 (세)}] \times \text{체중 (kg)}}{72 \times \text{혈청 크레아티닌 (mg/dL)}} \quad (\text{여성인 경우} \times 0.85)$$

신기능이 손상된 성인 환자에 대한 용량 조절

구분	크레아티닌 청소율(mL/min)	용량 및 빈도
정상	≥ 80	1일 1회, 10 mg
경증(경증상, 가벼운 증상)	50 - 79	1일 1회, 10 mg
중등도	30 - 49	1일 1회, 5 mg
중증(심한 증상)	< 30	매 2일마다 1회, 5 mg
말기 단계의 신 질환을 가진 투석중인 환자	< 10	금기

신장에(신장(콩팥)장애)를 가진 소아 환자는 환자의 신 청소율과 체중을 고려하여 개별적으로 용량을 조절해야 한다.

【사용상 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것

- 1) 이 약 및 히드록시진 또는 페페라진 유도체에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
- 2) 신부전 환자 (크레아티닌 청소율 < 10mL/min)
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 4) 6세 미만의 유아

2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것

- 1) 테오필린 (1일 1회, 400 mg)과 세티라진의 다회 투여 연구에서 테오필린의 약물동태는 세티라진과 함께 투여시 변화되지 않은 반면, 세티라진의 청소율은 약한 (16 %) 감소하였다. 2) 리토나비어 (600 mg, 1일 2회)와 세티라진 (1일 10 mg)의 다회 투여 연구에서, 리토나비어의 분해는 세티라진과 함께 투여시 약한 변화 (-11 %)된 반면, 세티라진에 대한 노출 정도는 약 40 % 증가하였다.

3. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것

- 1) 이 약이 모유를 통해 미량 분비되므로 투여 중에는 수유를 중단한다. 2) 다른 항히스타민제와 마찬가지로 과량의 알코올과 함께 투여하지 않는다.