

## 항바이러스제

# 팜시프로 정 Famcipro® Tab.

팜시클로비르 Famciclovir

【원료약품 및 그 분량】1정 중  
주성분 : 팜시클로비르(염구) ..... 250.00mg

### 【성상】

흰색의 원형 제형징

### 【효능·효과】

1. 대상포진 바이러스 감염증
2. 생식기포진 감염증의 치료 및 재발성 생식기포진의 억제

### 【용법·용량】

1. 대상포진 감염증의 치료  
성인: 팜시클로비르로서 1회 250 mg씩 1일 3회 7일간 경구투여한다. 감염 후 증상이 나타나지는 즉시 치료를 시작하는 것이 바람직하다.

2. 초발성 생식기포진 감염증의 치료  
성인: 이 약으로서 1회 250 mg씩 1일 3회 5일간 경구투여한다. 감염 후 증상이 나타나지는 즉시 치료를 시작하는 것이 바람직하다.

3. 급성 재발성 생식기포진 감염증의 치료  
성인: 이 약으로서 1회 125 mg씩 1일 2회 5일간 경구투여한다. 신구사기 또는 감염 후 증상이 나타나는 즉시 치료를 시작하는 것이 바람직하다.

4. 재발성 생식기포진의 억제  
성인: 이 약으로서 1회 250 mg씩 1일 2회 경구투여한다. 질병사면경과의 변화여부를 관찰하기 위해 6~12개월마다 주기적으로 치료를 중단한다.

5. 신장에 환자: 신장에 환자에서는 이 약의 크레아티닌 청소율이 감소하기 때문에 용량 조절에 신중을 기울여야 하며 이들에 대한 용법 용량은 아래와 같다.

1) 대상포진 및 초발성 생식기포진 감염증의 치료:

| 크레아티닌 청소율<br>(mL/min/1.73m <sup>2</sup> ) | 용량               |
|-------------------------------------------|------------------|
| 30~59                                     | 1회 250 mg씩 1일 2회 |
| 10~29                                     | 1회 250 mg씩 1일 1회 |

2) 급성 재발성 생식기포진 감염증의 치료:

| 크레아티닌 청소율<br>(mL/min/1.73m <sup>2</sup> ) | 용량               |
|-------------------------------------------|------------------|
| 30~59                                     | 1회 125 mg씩 1일 2회 |
| 10~29                                     | 1회 125 mg씩 1일 1회 |

3) 재발성 생식기포진 감염증의 억제:

| 크레아티닌 청소율<br>(mL/min/1.73m <sup>2</sup> ) | 용량               |
|-------------------------------------------|------------------|
| 30~59                                     | 1회 250 mg씩 1일 2회 |
| 10~29                                     | 1회 125 mg씩 1일 2회 |

## 전문약품

629

4) 혈청크레아티닌만 알고 있을 경우에는 다음 계산식으로 크레아티닌 청소율을 구할 수 있다.

남자 : (체중(kg) × (140-나이)) / (72 × 혈청크레아티닌(mg/dL))  
여자 : 0.85 × 남자에 대해 구해진 값

5) 혈액투석을 실시하는 신장에 환자

혈액투석 환자는 투석간격을 고려하여 48시간마다 투여하는 것이 바람직하다. 4시간 동안의 혈액투석은 이 약의 혈장 농도를 약 75% 감소시키므로 투석 후 즉시 이 약을 투여한다. 전장용량은 대상포진 환자에서는 250mg, 생식기포진 환자에서는 125mg이다.

6. 간장애 환자: 만성 대상성 간질환 환자의 경우에는 별도의 용량조절이 필요치 않다. 명백한 만성 비대성간질환 환자에 대해서는 충분한 치료경험이 없으므로, 명확한 권장용량이 설정되어 있지 않다.

### 【사용상 주의사항】

1. 다음 환자에게 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분 및 이 약의 생리활성물질인 팜시클로비르에 과민반응을 보이는 환자
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에게는 신중히 투여할 것.

- 1) 신장애 환자

3. 이상반응

- 1) 임상시험에서 두통 및 구역이 보고된 바 있으나 대개 경증 내지 중등도였고, 이와 같은 증상은 위약으로 치료받은 환자에게서도 유사한 빈도로 나타났다. 다른 모든 이상반응은 시간 후 경험에서 추가되었다. 빈도는 매우 흔함 (≥1/10); 흔함 (≥1/100, <1/10); 흔하지 않음 (≥1/1,000, <1/100); 드물게 (≥1/10,000, <1/1,000) 매우 드물게 (<1/10,000); 미상 (자료로부터 추정 불가)로 표시하였다.
- 2) 혈액 및 림프계: 드물게 혈소판감소증이 나타났다. 임상시험에서는 이 약 투여군에서 위약군보다 백혈구 및 호중구 감소가 더 자주 나타났다.
- 3) 정신신경계: 매우 흔하게 두통, 흔하게 어지러움, 흔하지 않게 착란 및 졸음(특히 고령자에서 많이 나타남), 드물게 환각이 나타났다.
- 4) 신장계: 드물게 신기능항진
- 5) 소화기계: 흔하게 구역, 구토, 복통 및 설사가 나타났다.
- 6) 간기능: 드물게 간기능 검사 이상, 드물게 황달이 나타났다.
- 7) 피부 및 피하조직: 흔하게 피부발진 및 가려움이 나타났고, 흔하지 않게 두드러기 및 혈관부종(예: 얼굴부종, 눈꺼풀부종, 눈썹부종, 입두부종)이 나타났다. 중증 피부부종(예: 다형홍반, 스티븐스-존슨 증후군, 독성표피괴사증후군) 및 백혈구과 과상혈관염이 나타났는데 사발모 및 문헌에서 수집된 정보이기 때문에 그 빈도는 미상이다.
- 8) 신장: 신기능을 고려하여 적절히 이 약의 용량을 감소시키지 않은 신질환 환자에서 드물게 급성신부전이 보고되었다.
- 9) 국내 시판후 조사 결과(조사종례수: 4,304명) 나타난 이상반응은 다음과 같으며, 이 약과의 관련 여부는 확실하지 않다.: 상복부통, 변비, 간기능 이상, 설사, 복부

팽만감, 소화불량, 안면부종, 피로, 통증, 백혈구감소증, 불면, 생리기간 단축, 배뇨곤란

### 4. 일반적 주의

- 1) 이 약은 생식기포진을 원치시킬 수 있으며, 이 약 치료가 시작된 이후라도 생식기 포진의 증상이 있을 때는 성적 접촉을 피할 것을 환자에게 조언해야 한다. 또한 전염의 가능성이 있기 때문에 이 약의 치료와 더불어 안전한 성관계를 가질 것이 권장된다. 재발의 첫 증상이나 증후가 보이면 바로 치료를 시작하도록 교육한다.
- 2) 이 약이 운전 또는 기계조작 능력에 영향을 미친다는 증거는 없다. 그러나 이 약을 복용하는 동안 어지러움, 졸음, 혼동 및 기타 중추신경계 장애를 경험한 환자들은 운전이나 기계조작을 삼가해야 한다.
- 3) 감기 내지 중등도의 간장애 환자는 신기능이 정상이면 특별한 용량을 조절할 필요가 없다. 중증의 간장애 환자를 대상으로 연구된 바 없지만, 이러한 환자에서 팜시클로비르가 생리활성물질인 팜시클로비르로 전환되지 않아 혈장 팜시클로비르 농도가 낮아져 약효가 감소될 가능성이 있다.

### 5. 상호작용

- 1) 전임상시험에서 이 약은 시트코를 P450을 유도하거나 CYP3A4를 억제할 가능성은 없는 것으로 나타났다.
- 2) 이 약에 대한 다른 약물의 영향
  - 일로푸리롤, 시메티딘, 테오필린, 지도부딘, 프로메타진, 제산제(마그네슘 및 수산화알루미늄) 투여 후, 혹은 엠트리시타빈과 동시에 이 약 500mg을 단독 투여시 생리활성물질인 팜시클로비르의 약동학에 임상적으로 유의한 변화가 나타나지 않았다.
  - 이 약 다환투여(1회 500mg, 1일 3회) 후 다국산을 다환 투여했을 때 팜시클로비르의 약동학에 임상적으로 유의한 변화가 관찰되지 않았다.
  - 농동적 신세뇨관 분비에 의해 주로 배설되는 약물들(예: 프로메타진) 혈장 팜시클로비르 농도를 상승시킬 수 있다. 따라서 이 약을 1회 500mg, 1일 3회 복용하는 환자가 프로메타진을 며칠간 연속적으로 병용할 시에는 독성이 나타나는지 모니터링하고, 이 약의 용량 감소를 고려할 수 있다.
  - 팜시클로비르는 알데하이드산화효소에 의해 대사되므로, 이 효소를 유도/억제하거나 이 효소의 대사를 받는 다른 약물 상호작용을 일으킬 가능성이 있다. In vitro 알데하이드산화효소저해제인 시메티딘 및 프로메타진과의 임상적 상호작용을 알아보는 시험에서 병용투여가 생리활성물질인 팜시클로비르 형성에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났지만, 강력한 in vitro 알데하이드산화효소저해제인 라독시펜은 팜시클로비르 형성을 감소시킬 수 있는 것으로 나타났다 때문에 이 약을 라독시펜과 병용시 치료 효과를 모니터링해야 한다.

3) 다른 약물에 대한 이 약의 영향

- 이 약 500mg 단독 또는 다환투여(1회 500mg, 1일 3회)를 다국산과 병용했을 때 다국산의 약동학을 변하지 않았다.
- 이 약 500mg 단독투여를 지도부딘 또는 엠트리시타빈과 병용했을 때 지도부딘, 지도부딘의 대사체인 지도부딘글루쿠로니드 및 엠트리시타빈의 약동학에 임상적으로 유의한 영향이 관찰되지 않았다.
- 이 약은 in vitro에서 알데하이드산화효소를 약하게 저해하는 것으로 나타났다.

### 6. 임부, 수유부 및 गर्임여성에 대한 투여

- 1) 동물실험에서 이 약 및 생리활성물질인 팜시클로비르에 의해 태자독성이나 기형발생이 나타나지는 않았다. 동물실험에서는 고형의 병리조직학적 변화가 관찰되었으나, 사람에서는 이 약을 1회 250 mg, 1일 2회 장기간 투여했을 때 남성의 정자수, 정자 형태, 운동 등에도 위약적 영향을 미치지 않았다. 500 mg/kg을 투여한 수컷 랫드에서 생식능의 감소가 관찰되었으나, 랫트 랫드의 생식능에는 의미있는 변화가 나타나지 않았다.
- 2) 임신 중 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 3) 수유부: 랫드를 이용한 동물실험에서 이 약의 경우 투여 후 팜시클로비르가 유즙으로 이행되는 것으로 나타났다. 사람 모유로의 이행에 대한 정보는 알려진 바 없다. 수유부에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 4) गर्임여성: गर्임여성에 대한 자료는 없으며 특별한 추천사항은 없다.

7. 소아에 대한 투여  
18세 미만의 소아에 대한 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직하다.

8. 고령자에 대한 투여  
일반적으로 고령자에게서 용량 조절은 요구되지 않으나 신장애가 있는 경우 용량 조절이 필요하다.

### 9. 과량투여시의 처치

이 약을 과량 투여한 경험은 제한적이다. 과량 투여 시 적절한 보조적 치료 및 대증적 치료를 실시한다. 혈액투석을 실시 할 수 있으며, 이 약의 생리활성물질인 팜시클로비르는 4시간의 혈액투석으로 혈장농도가 75%까지 감소될 수 있다.

### 10. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 30℃ 이하의 장소에 보관한다.
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 3) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고의 원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 주의한다.

### 11. 기타

임상적 용량의 약 50배를 투여한 랫트 랫드 고령률 투여군(600 mg/kg/day)에서 유선암의 발생빈도가 증가하였다. 어떤 랫드를 대상으로 태어난 후 4일째부터 10주 동안 매일 팜시클로비르 0, 40, 125 또는 400 mg/kg/day를 투여했을 때, 투약과 관련된 사망 또는 임상적 관찰은 없었다. 성숙 동물에 비해 어린 랫드에서 팜시클로비르의 독성이 증가되지는 않았다.

### 【포장단위】 21정/병

【저장방법】 기밀용기, 건조(30℃이하)보관

- ※ 본 제품을 복용하기 전에 사용설명서를 주의 깊게 읽어아하며, 사용설명서는 본 제품과 함께 보관하십시오.
- ※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해드립니다. 제품에 대한 문의사항 및 본 사용설명서의 최종상담실(2016년 11월 22일) 이후 변경된 내용은 한화제약 홈페이지(www.hwpharm.com) 또는 고객센터(Tel.02-959-3679)로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 약약분봉지는 온라인 의약품사전(http://drug.mfds.go.kr)을 참조하십시오.

61100-1-1

제조의처

**한화제약**

경남도 창원시남면 999길 109

제조사

**(주)동구바이오제약**

경기도 화성시 향남읍 책곡로22길 18