

엘페리온정

(에페리손염산염)

전문 의약품
분류번호: 122

【원료약품의 분량】 1정 중

에페리손염산염(L*) 50mg
동불유래성분 : 유당수화물(소,우유), 셀라렌(소,미부)

【성상】 흰색 원형의 당알약

【효능·효과】

1. 근골격계질환에 수반하는 통풍성 근육연축 : 경간완중후군, 근간완중후군, 요통
2. 신경계 질환에 의한 경직성 마비 : 뇌혈관장애, 경직성 척수마비, 경부척추증, 수술후 후유증(뇌·척수종양 포함), 외상후유증(척추손상, 두부외상, 근육위축성 근육경직증, 뇌성마비, 척수소뇌변성증, 척수혈관장애, 아급성 척수신경병변, 기파의 뇌척수질항

【용법·용량】

성인 : 염산에페리손으로서 1회 50 mg 1일 3회 식후에 경구투여한다.
연령, 중상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 않 것.
 - 1) 이 약에 과민증 환자
 - 2) 중증의 근육력증 환자
 - 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에는 투여하면 안된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 약물과민증의 병력이 있는 환자
 - 2) 간장애 환자(간기능을 악화시킬 수 있다)
 - 3) 이 약은 황색소(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 부작용
 - 1) 속 : 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 2) 간질 : 드물게 ALT, AST, ALP의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 3) 신장 : 드물게 단백뇨, BUN의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 4) 혈액 : 드물게 빈혈 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 5) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있다.
 - 6) 정신신경계 : 때때로 불면, 졸음, 두통, 사지마비, 드물게 몸의 굳어짐, 사지떨림 등이 나타날 수 있다.
 - 7) 소화기계 : 때때로 구역, 구토, 식욕부진, 위부불쾌감, 구갈, 변비, 설사, 복통, 드물게 복부팽만감, 구내염 등이 나타날 수 있다.
 - 8) 비뇨기계 : 드물게 요배, 요실금, 잔뇨감이 나타날 수 있다.

- 9) 전신증상 : 때때로 무력감, 비열거림, 전신관대감, 드물게 어지러움, 근간장지해 등이 나타날 수 있다.
- 10) 기타 : 때로 안면홍조, 드물게 발한, 부종이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약 투여 중에 무력감, 비열거림, 졸음 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 갑작 또는 투여를 중지한다.
- 2) 졸음, 주의력, 집중력, 반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

5. 상호작용

이 약의 유사작용인 경산폴리메리온과 메토키프라미드를 병용시 시조열장애가 나타났다는 보고가 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 2) 수유부에는 투여를 피하는 것이 바람직하나 부득이하게 투여할 경우에는 수유를 중단한다.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다).

8. 교통사고에 대한 투여

일반적으로 교통사고에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30정, 500정

【제조자】 영동제약(주) (인천광역시 남동구 함박로 333)

【제조외지사】 조아제약(주) (경상남도 함안군 함안로 318)

【판매자】 우리들제약(주) (경기도 화성시 향남읍 제왕로2길 50)

- ◆ 본 제품은 영락한 품질관리를 위한 제품입니다. 본 제품을 구입시 유효기한이 경과 되었거나 변질·변패 또는 오손되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.
- ◆ 이 설명서의 개정일자 2016년 07월 08일 이후 변경된 내용은 본사 홈페이지(www.woodulpharm.com) 또는 소비자상담실(080-080-4211)에서 확인하실 수 있습니다.
- ◆ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보를 참조하십시오.

의사나 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
EPH 2016.07.08-00