

칼리크정 (칼리디노게나제)

KalliK Tab.

[칼리디노게나제(JP)]

칼리크정은 포유동물의 췌장 추출 정제물인 칼리디노게나제를 함유한 순환기 조정제입니다. 칼리디노게나제는 생리적 혈관확장제로서 말초혈관의 혈액순환을 개선하고 혈류량을 증가시키며 완화된 혈압강하 작용을 함으로써 순환장애 및 그로 인한 조직의 영양장애에 의한 질환의 치료에 널리 쓰이고 있는 제제입니다.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분: 칼리디노게나제(JP) 50 I.U.
- 첨가제(동물유래): 무수유당(소, 우유)
- 첨가제(타르색소): 적색3호, 적색40호
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스프탈레이트

[성상]

적색의 원형 장용성 필름코팅정

[효능·효과]

1. 다음 질환에 의한 말초순환장애: 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
2. 갱년기장애, 망맥락막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

[용법·용량]

1일 30~150 I.U.를 3회 분할하여 경구투여 한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
 - 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 이상반응
 - 1) 과민증: 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
 - 2) 순환기계: 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
 - 3) 소화기계: 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
 - 4) 기타: 때때로 열감, 드물게 두통, 두중, 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있다.
3. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[포장단위] 30정, 300정

[소비자상담] 080-957-7190

※ 자세한 의약품 정보는 자사 홈페이지(<http://www.nbkpharm.com>) 또는 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 통해 확인할 수 있습니다. 본 제품이 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국 의약품안전관리원 (1644-6223)

작성년월일 : 2021.01.11
0A041-00

[제조사]


메디카코리아
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 96

[제조의회사]


엔비케이제약(주)
NEO BIO KOREA PHARM. CO., LTD.
충남 천안시 동남구 풍세면 풍세로 539