

부테나크림

(부테나핀염산염)

□원료약품 및 그 분량

1g 중

- 유효성분 : 부테나핀염산염(JP).....10mg
- 첨가제(보존제) : 벤조산나트륨(KP).....2mg
- 기타첨가제 : 글리세릴스테아레이트SE, 농글리세린, 백색바셀린, 세탄올, 스테아르산, 정제수, 트롤아민, 폴리옥시에틸렌세틸에테르, 프로필렌글리콜디카프릴레이트

□성상

약간의 특이한 냄새가 있는 흰색의 크림

□효능·효과

다음의 피부진균증

1. 백선 : 족부백선(발백선증, 무좀), 고부백선(대퇴부백선)(완선(사타구니백선(증))), 체부백선
2. 어루러기

□용법·용량

1일 1회 환부(질환부위)에 바른다.

치료기간 이후에도 임상적인 증상이 개선되지 않으면 진단을 다시 해야 한다.

□사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약 성분에 과민증의 병력이 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
알릴아민계 항진균제에 민감한 환자 (교차반응이 나타날 수 있다)
3. 부작용
 - 피부 : 때때로 국소자극감, 발적 (충혈되어 붉어짐), 홍반(붉은 반점), 가려움, 접촉피부염, 수포 (물집), 드물게 미란(긁무름), 인설(비늘겉질), 균열(틈새, 열창)이 나타날 수 있다.
4. 일반적주의
 - ① 이 약 사용으로 인해 자극 또는 민감성이 나타나면 치료를 중지하고 적절한 요법을 실시한다.
 - ② 수산화칼륨용액으로 직접적인 현미경적 검사 또는 적당한 배지에 배양함으로써 질병의 진단을 확인할 수 있다.
 - ③ 의사의 지시가 없는 한 밀봉봉대법 또는 포장법을 사용하지 않는다.
 - ④ 적응증 이외의 질환에 이 약을 투여하지 않는다.
 - ⑤ 이 약에 대한 반응이 나타나지 않으면 진단학적 검사를 실시하여 다른 병원균에 의한 감염 여부 확인 후 다른 항진균요법을 시행한다.
 - ⑥ 이 약은 안식향산 나트륨을 포함하고 있으며, 안식향산은 피부, 눈, 점막에 경미(가벼운, 대수롭지 않은)한 자극이 될 수 있다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

- ① 임신 중의 사용에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- ② 이 약의 모유로의 이행 여부에 대해 알려진 바 없으나 많은 약물들이 모유로 이행하므로 수유부에 이 약 투여시 주의한다.

6. 소아에 대한 투여

미숙아, 신생아 및 12세 이하의 소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다.

7. 적응상의 주의

- ① 이 약은 외용으로만 적용한다.
- ② 눈, 코, 입 및 다른 점막에 닿지 않도록 주의하여 적용한다.
- ③ 심한 미란(긁무름) 부위에는 사용하지 않는다.
- ④ 족부백선(발백선증, 무좀), 체부백선, 완선(사타구니백선(증)) 환자의 환부(질환부위) 및 그 주위의 피부를 닦을 수 있도록 이 약을 충분히 적용한다.
- ⑤ 이 약을 적용하기 전에 환부를 깨끗이 씻고 완전히 건조시킨 후에 적용하며 적용후에는 손을 씻는다.

8. 저장상의 주의사항

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

□포장단위

15g/Al류브, 450g/병

□저장방법

차광, 기밀, 실온보관(1~30℃)

□첨부분서 시행일자

2018. 07. 30

- 이 첨부분서 시행일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.jw-shinyak.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

□교환 및 제품문의

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질·부패 또는 오손된 제품 등은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다. 또한 제품에 관한 문의사항이 있으시면 연락주시시오.
연락처 : 고객센터 1588-4675 / 080-090-6777(수신자부담)
- 본 약제 투약 또는 복용 후 부작용(이상사례)이 발생한 경우 한국약약품안전관리원(1644-6223)으로 문의 및 보고하여 주시고, 동일기관에 의약품 부작용 피해구제 신청을 하실 수 있습니다.



원료·기술 제공
KAKEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Tokyo, Japan

jw 신약
제이더블유신약(주)
경기도 평택시 산단로 88-24