

뉴셀렌^{연질캡슐}

우수 의약품
KGMP적격업체
일반 의약품
분류번호:03190

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(1,835mg) 중

유비데카레논(코엔자임큐텐(KP))	5,000mg
토포페롤아세테이트(KP) (비타민E로서 200IU)	200,000mg
셀레늄함유건조효모(별규) (셀레늄으로서 50µg)	38,462mg
아스코르브산(KP)	500,000mg
농축콜레칼시페롤(유상)(BP) (비타민D로서 200IU)	0,200mg
산화아연(KP) (아연으로서 14mg)	17,430mg
착색제(천연색소): 카카오색소, 차차청색소	

[성 상] 미황색 또는 연한 노란색 내용물이 든 암갈색의 장방형 연질캡슐

[용법용량] 만 12세 이상 및 성인: 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

[효능효과]

1. 다음 경우의 비타민 C, D, E 의 보급

- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 발육기, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방
 - 말초혈행장애 및 경년기시 다음 증상의 완화: 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
 - 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화, 잇몸출혈·비출혈(코피)예방

2. 아연의 보급

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- (1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증 질환), 신장질환환자
- (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- (4) 신장(콩팥)결석 환자
- (5) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- (6) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

인산염, 갈슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우는 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 옥살염이 배설되는 상태)
- (3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다
- (4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- (5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- (6) 신장(콩팥)장애 환자
- (7) 저단백혈증 환자
- (8) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
- (9) 신장결석 병력이 있는 환자
- (10) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 설사, 위부(상복부)불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관(창자)장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종(부기)
- (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다
- (3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증(혈관막힘)의 위험이 증가될 수 있다
- (4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다
- (5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다
- (6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여(함께복용)시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
- (7) 우발적으로 과량복용 한 경우
- (8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- (2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다
- (3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것
- (4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야한다

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[포장단위] 60연질캡슐, 120연질캡슐

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] 제조일로부터 24개월

[소비자상담실] 02-568-0051

[제조원] (주)알피바이오 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

[판매원] 일양약품(주) 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 설명서 작성일자 이후 변경된 내용은 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

설명서 작성일자: 2016년 08월 31일