

우수의약품	전문의약품
KGMP적격업체제품	분류번호 : 232
소화성 궤양용제	
이소졸[®] 정 이소졸[®] 정 40mg	
(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)	
※ 제품의 안정성을 위해 반드시 복용시까지 포장상태(Alu-Alu)로 조제 및 보관하여 주시기 바랍니다.	

■원료약품 및 그 분량：1정 중

이소졸정		이소졸정40mg	
유효 성분	에스오메프라졸마그네슘삼수화물(미분화)(별규) ... 22.25mg (에스오메프라졸로서 20mg)	에스오메프라졸마그네슘삼수화물(미분화)(별규) ... 44.5mg (에스오메프라졸로서 40mg)	
첨가제 (타르색소)	적색40호 알루미논레이크, 황색203호 알루미논레이크	-	
기타 첨가제	미결정셀룰로오스, 수산화마그네슘, 시트르산트라이메틸, 아크릴리스틴핵(93A18597), 오파드라이II 빨간색(85F64732), 오파드라이II 흰색(85F18422), 크로스포비돈, 포비돈, 푸마르산스테아릴나트륨, D-만니톨, L-아르기닌	미결정셀룰로오스, 수산화마그네슘, 시트르산트라이메틸, 아크릴리스틴핵(93A18597), 오파드라이II 빨간색(85F15458), 오파드라이II 흰색(85F18422), 크로스포비돈, 포비돈, 푸마르산스테아릴나트륨, D-만니톨, L-아르기닌	

- 성상**: 이소졸정: 연분홍색의 원형 필름코팅정
이소졸정40mg：분홍색의 원형 필름코팅정

■효능·효과

- 위식도 역류성질환(GERD)
 - 미란성 역류식도염의 치료
 - 식도염 환자의 재발방지를 위한 장기간 유지요법
 - 식도염이 없는 위식도 역류질환의 증상치료요법
- 헬리코박터필로리 박멸을 위한 항생제 병용요법
 - 헬리코박터필로리 양성인 십이지장궤양의 치료
 - 헬리코박터필로리 양성인 소화성궤양 환자의 재발방지
- 비스테로이드소염진통제(COX-2 비선택성, 선택성) 투여와 관련된 상부 위장관 증 상(통증, 불면 감, 작열감) 치료의 단기요법
- 지속적인 비스테로이드소염진통제 투여가 필요한 환자
 - 비스테로이드소염진통제 투여와 관련된 위궤양의 치료
 - 비스테로이드소염진통제 투여와 관련된 위궤양 및 십이지장궤양의 예방
- 출렁거-열리신 증후군의 치료
- 정맥주사로 위궤양 또는 십이지장궤양에 의한 재출혈 예방 유도 이후의 유지 요법

■용법·용량

이 약은 물 등의 액체와 함께 삼켜야 하며 씹거나 부수어서는 안된다.

- 성인
 - 위식도 역류성 질환(GERD).
 - 미란성 역류식도염의 치료：4주동안 1일 1회, 1회 40mg을 투여한다.
 - 식도염이 치료되지 않거나 증상이 계속되는 환자의 경우 4주 더 복용한다.
 - 식도염 환자의 재발 방지를 위한 장기간 유지요법：1일 1회, 1회 20mg
 - 식도염이 없는 위식도 역류질환의 증상치료요법：
 - 1일 1회, 1회 20mg, 4주후에도 증상 조절이 되지 않을 경우 추가 진료가 필요하다.
 - 일단 증상이 완화되면 그 후 연속되는 증상은 1일 1회, 1회 20mg을 투여하여 조절한다.
 - 성인에서, 1일 1회, 1회 20mg을 필요시마다 투여할 수 있다. 비스테로이드소염진통제 투여로 위궤양 및 십이지장궤양의 발현 위험이 높은 환자에게는 연속되는 증상 조절을 위해 필요시마다 투여하는 것을 권장하지 않는다.
 - 헬리코박터필로리 박멸을 위한 항생제 병용요법
이 약 20mg을 아목시실린 1g, 클레트리마ixin 500mg과 병용하여 1일 2회, 7일간 투여한다.
 - 비스테로이드소염진통제(COX-2 비선택성, 선택성)투여와 관련된 상부 위장관 증상(통증, 불면 감, 작열감) 치료의 단기요법
 - 1일 1회, 1회 20mg, 4주후에도 증상이 조절이 되지 않을 경우 추가진료가 필요하다. 4주를 초과하는 임상시험은 실시되지 않았다.
 - 지속적인 비스테로이드소염진통제 투여가 필요한 환자
 - 비스테로이드소염진통제 투여와 관련된 위궤양의 치료：1일 1회, 1회 20mg. 치료기간은 4~8주이다.
 - 비스테로이드소염진통제 투여와 관련된 위궤양 및 십이지장궤양의 예방：1일 1회, 1회 20mg.
 - 출렁거-열리신 증후군의 치료
관장 초회 용량은 40mg 1일 2회 투여이다. 이후 용량은 환자별로 조절되어야 하며, 임상증상이 있는 동안 치료를 지속해야 한다. 임상자료에 따르면, 대부분의 환자는 1일 80~160mg의 용량 에서 조절 가능하다. 1일 80mg 이상의 용량은 1일 2회로 나누어 복용하도록 한다.
 - 정맥주사로 위궤양 또는 십이지장궤양에 의한 재출혈 예방 유도 이후의 유지 요법
정맥주사로 위궤양 또는 십이지장궤양에 의한 재출혈 예방 유도 이후 4주동안 1일 1회, 1회 40mg을 투여한다.
 - 12세 이상의 청소년
 - 위식도 역류성 질환(GERD)
 - 미란성 역류식도염의 치료：4주동안 1일 1회, 1회 40mg을 투여한다.
 - 식도염이 치료되지 않거나 증상이 계속되는 환자의 경우 4주 더 복용한다.
 - 식도염이 없는 위식도 역류질환의 증상치료요법：
 - 1일 1회, 1회 20mg, 4주후에도 증상 조절이 되지 않을 경우 추가 진료가 필요하다.
 - 일단 증상이 완화되면 그 후 연속되는 증상은 1일 1회, 1회 20mg을 투여하여 조절한다.
 - 성인에서, 1일 1회, 1회 20mg을 필요시마다 투여할 수 있다. 비스테로이드소염진통제 투여로 위궤양 및 십이지장궤양의 발현 위험이 높은 환자에게는 연속되는 증상 조절을 위해 필요시마다 투여하는 것을 권장하지 않는다.
- 12세 미만의 소아
이 약을 12세 미만의 소아에 투여한 경험은 없다.
- 신1증상에
용량을 조절할 필요는 없다. 중증의 신부전환자에 투여한 예가 많지 않기 때문에 신중히 투여하여야 한다.
- 간1증상에
경증~중증도의 간장애 환자에서 용량을 조절할 필요는 없다. 중증 간장애환자의 경우 이 약 20mg 용량을 초과해서는 안된다.
- 고령자
용량을 조절할 필요가 없다.

■사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 이 약, 이 약의 구성성분 또는 벤조이미다졸류에 과민반응 및 그 병력이 있는 환자
 - 파라시탈로 항생제에 과민반응 환자(헬리코박터필로리 박멸을 위해 아목시실린과 병용요법시)
 - 마크로라이드계 항생제 과민반응 환자(헬리코박터필로리 박멸을 위해 클레트리도마ixin과 병용 시에 한함.)
 - 테르페넨인, 시사프리드, 피오지드, 아스테미졸을 투여 받고 있는 환자(헬리코박터필로리 박멸을 위해 클레트리도마ixin과 병용시에는 항생제 복용중일 때 투여할 수 있음, 1시간이상작용함 참조)
 - 아타자나비르 및 넴피나비르를 투여 중인 환자(상호작용함 참조)
 - 수유부
- 심근경색 및 그 병력이 있는 환자
- 릴피비린 함유제제를 투여중인 환자 (상호작용함 참조)
- 이상반응
 - 다음의 이상반응이 임상시험과 시판 후 조사에서 확인 또는 의심되었다. 용량 상관계는 없었다. 이상반응을 빈도에 따라 분류하였다(자주) 1/100, (< 1/10；때때로) 1/1,000, (< 1/100；드물게) 1/10,000, (< 1/1,000；매우 드물게 1/10,000).
 - 혈액 및 림프계：드물게 백혈구감소증, 저혈소판증, 매우 드물게 무골수증, 변별혈구감소증
 - 면역계：드물게 발열, 발진부종, 아나필락시스 반응/쇼크 등과 같은 과민반응
 - 대사/영양：때때로 말초 부종, 지나친칼슘혈증, 매우 드물게 저마그네슘혈증 (중증의 저마그네슘혈증은 저칼슘혈증을 유발할 수도 있다. 저마그네슘혈증은 또한 저칼륨혈증을 유발할 수 있다).
 - 장기계：때때로 불면, 드물게 초조, 정신 혼란, 우울, 매우 드물게 공격성, 환각
 - 신경계：자주 두통, 때때로 어지럼(dizziness), 지각이상, 졸음, 드물게 미각장애
 - 시각：드물게 흐린시력
 - 청각 및 미로계：때때로 어지림(vertigo)
 - 호흡기계：드물게 기관지경련
 - 위장관계：해장염, 자주 복통, 변비, 설사, 복부팽만감, 구역·구토, 때때로 구강건조증, 드물게 구내염, 위장관 칸디다증, 매우 드물게 현미경적 결장염
 - 간담도계：때때로 간효소 증가, 드물게 혈당을 동반하거나 동반하지 않는 간염, 매우 드물게 간부전, 기존 간질환이 있는 환자에서 뇌병증
 - 피부 및 피하조직：때때로 피부염, 가려움, 발진, 두드러기, 드물게 탈모, 광각수상, 매우 드물게 다형홍반, 피부종막안홍증군(스티븐스-존슨증후군), 독성표피괴사증후(리얼증후군), 급성 전신 피진성 농포증, 호산구 증가 및 전신 증상 동반 약물 반응(DRESS 증후군)
 - 근골격계：골절 드물게 관절통, 근육통, 매우 드물게 근육괴사
 - 신장 및 비뇨기계：매우 드물게 간질신장염
 - 생식계：매우 드물게 여성형유방
 - 전신 및 투여부위：드물게 무력증, 발한증가
 - 감염：클로스트리듐 디피실레성 설사(빈발성)
 - 이외에 다음의 이상반응이 1% 미만의 발생률로 이 약과 관련이 있거나 또는 관련 가능성이 있 는 것으로 보고되었다.
 - 전신：복부팽만, 알레르기 반응, 등통, 흉통, 흉골가슴통, 안면부종, 안면홍조, 피로, 발열, 인플루엔자상징에, 일반부종, 다리부종, 견대, 통증, 경직, 무력증, 말초부종
 - 심혈관계：홍조, 고혈압, 빈맥
 - 내분비계：갑상샘증
 - 소화기계：대장과민증, 변비악화, 소화불량, 연하곤란, 위장관항생제에, 상복부통증, 트림, 식도장애, 잦은배변, 위장염, 위장관출혈, 딸꾹질, 흑색변, 구강장애, 인두장애, 직장장애, 위장관 증상, 혈중가스트린증가, 하장예, 허부종, 궤양성 구내염, 구토
 - 청각：귀알이, 이명
 - 혈액계：빈혈, 자색소빈혈, 자궁경부암피절병증,코피, 백혈구증가증, 백혈구감소증, 혈소판감소증
 - 간：빌리루빈혈증, 간기능 이상, ALT 증가, AST 증가
 - 대사/영양：당뇨, 고요산혈증, 지나친트루혈증, ALP증가, 구갈, 비타민 B12결핍, 체중증가, 체중감소
 - 근골격계：관절염악화, 관절병증, 경련, 섬유근육통증후군, 탈장, 류마티스성 다발성근육통, 관절통
 - 정신신경계：식욕부진, 무감동, 식욕증가, 혼란, 우울악화, 과다근육긴장증, 초조, 감각저하, 발기부전, 불면증, 편두통, 편두통악화, 수면장애, 떨림, 어지림(dizziness, vertigo), 시야결손, 지각이상, 졸음
 - 생식계：월경통, 월경장애, 절멸
 - 호흡기계：천식악화, 기침, 호흡곤란, 후두부종, 인두염, 비염, 부비동염
 - 피부/부속기관：여드름, 원문가려움, 발진, 홍반발진, 반구진상발진, 혈관홍조, 피부부염, 가려움, 두드러기, 발한증가
 - 특수감각：중이염, 이상청각, 미각소실, 미각도착
 - 비뇨기계：소변이상, 일부민노, 방광염, 뇨노곤란, 진균감염, 혈뇨, 뇨배출수, 칸디다증, 생식기칸디다증, 당뇨
 - 시각：결막염, 시각이상
 - 내시경 상에서 발견된 이상반응：십이지장염, 식도염, 식도환학, 식도궤양, 식도정맥류, 위궤양, 위염, 양성성립 또는 결절, 바렛식도(Barrett's esophagus), 점막번색, 탈장
- 다음은 프로톤펌프억제제의 시판 후 조사를 통해 보고된 이상반응이다. 이 이상반응은 불특정 다수의 인구집단에서 자발적으로 보고된 것이기 때문에, 항상 발생률을 신중히 있게 예측하거나 이를 투여와의 인과관계를 확립할 수 있지는 않다.
 - 면역계：전신홍반루푸스
 - 피부 및 피하조직계：피부홍반루푸스
 - 위장관계：위저선 용종
- 형문근용해：형문근용해가 나타날 수 있으나 신중하게 관찰하고 근육통, 무력증, 크레아티닌키 나제(크레아티닌산화효소) 상승, 혈중 및 소변 미오글로빈 상성을 포함하는 증상이 나타난 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 취해야한다.
- 일반적 주의
 - 이 약으로 인해 악성종양의 증상이 완화되거나 진단이 지연될 수 있으므로 악성 종양이 의심되는 경고 증상(의도하지 않은 현저한 체중 감소, 재발성 구토, 삼킴곤란, 토혈, 흑색변 등)이 있으면서 위궤양이 있거나 의심되는 경우 악성이 아님을 확인하고 투여해야 한다.
 - 이 약으로 장기간 치료할 경우(특히 1년 이상) 환자는 정기적으로 검사를 받아야 한다.
 - 이 약을 필요시 투여하는 환자에게는 증상의 변화가 있을 때 의사와 상담하도록 주의시킨다. 이 약을 필요시 투여하도록 처방받은 경우 이 약의 혈중농도 변동으로 인한 다른 약물과의 상호작용을 고려하여야 한다.
 - 헬리코박터필로리 박멸을 위한 항생제 병용요법으로 이 약과 같이 투여하는 항균제의 사용설명서를 참조하여야 한다. 클레리트로마ixin은 강력한 CYP3A4억제제이므로 시사프리드와 같이 CYP3A4에 의해 대사되는 다른 약물을 복용하고 있는 환자에는 복용요법을 실시할 경우에는 클레리트로마ixin의 용기 및 상호작용을 고려해야 한다.
 - 프로톤펌프억제제에 의해 위내 산도가 감소하면 위장관에 보통 존재하는 세균의 수가 증가한

- 이 약으로 치료할 때 살모넬라, 캄필로박터, 클로스트리듐 디피실레와 같은 세균에 의한 위장관의 감염 위험이 약간 증가할 수 있다. 이것을 클로스트리듐 디피실레균성 설사 위험성 증가와 연관이 있으며 특히 입원환자에서 이러한 위험성이 증가되었다는 여러 관찰연구 결과가 보고되었다. 이러한 진단은 설사증세가 개선되지 않았을 때 고려되어야 한다. 클로스트리듐 디피실레균성 설사는 거의 모든 항균제 사용 중 보고되고 있다.
- 일반 해의 역학연구에서 프로톤펌프억제제(Proton Pump Inhibitor) 치료가 고관절, 손목 및 척추 골절의 위험성 증가와 관련이 있을 가능성이 있다고 보고되었다. 골절의 위험은 권장용량을 상회하는 고용량을 투여한 환자와 1년 이상의 장기사용 환자에서 증가되었다. 오메프라졸 및 에스오메프라졸과 골다공증성 골절 간의 인과관계가 밝혀진 것은 아니라, 골다공증 및 골다공증성 골절이 진행될 위험이 있는 환자의 경우 최선의 임상 지침에 따라 적절한 임상적 모니터링이 권고된다.
- 3개월 이상 프로톤펌프억제제(Proton Pump Inhibitor) 치료를 받은 환자들에게서 저마그네슘혈증이 드물게 보고되었으며, 1년 이상 치료를 받은 경우에 가장 많이 나타났다. 대부분의 환자들에게 저마그네슘혈증의 치료로서 마그네슘보충 및 프로톤펌프억제제(Proton Pump Inhibitor) 투여 중단이 필요하다. 장기간 치료가 필요하거나 다국산 또는 저마그네슘혈증을 유발하는 약물에, 이소제를 병용투여하는 환자들은 치료 시작을 포함한 주적격 마그네슘 수치 모니터링이 필요하다. 중대한 이상반응은 감지, 부위명, 발작을 포함한다.
- 실험실적 검사와의 간섭：증가된 CgA(serum chromogranin A) 수치는 신경 내분비 종양 검사에 간섭을 일으킬 수 있다. 이 간섭을 피하기 위해 CgA 측정치가 적어도 5일 전 일시적으로 에스오메프라졸 투여를 중지해야한다 한다.
- 메토트렉세이트：프로톤펌프억제제와 메토트렉세이트(주로 고용량을 사용하는 경우, 메토트렉세이트의 사용상의 주의사항 참조)를 병용하는 경우 메토트렉세이트 그리고/또는 그 대사체의 혈청 농도가 상승 및 지속되어 메토트렉세이트의 독성이 나타날 수 있다는 문헌보고가 있었다. 고용량의 메토트렉세이트를 사용하는 경우, 프로톤펌프억제제의 일시적인 투여 중단을 고려할 수 있다(상호작용함 참조).
- 치료시 결과를 충분히 관찰하고 증상에 따라 이 약을 최소용량 및 적절한 치료기간으로 투여하여야 한다.
- 피부 및 전신홍반루푸스：프로톤펌프억제제를 복용한 환자에서 피부홍반루푸스(Cutaneous lupus erythematosus, CLE)와 전신홍반루푸스(Systemic lupus erythematosus, SLE)가 보고되었다. 이러한 사례들은 새로 발생하거나 기존의 자가면역질환의 악화로 발생하였다. 프로톤펌프억제제로 유발되는 홍반루푸스 사례는 대부분 피부홍반루푸스이다. 프로톤펌프억제제를 복용한 환자에서 보고된 피부홍반루푸스의 가장 흔한 형태는 이금성피부홍반루푸스이다, 영어부터 노인에 이르기까지 지속적인 약물 치료 후 수주에서 수년 이내에 발생하였다. 일반적으로 조직학적 결과에 장기침습이 없는 상태로 관찰되었다. 프로톤펌프억제제를 복용한 환자에서 전신홍반루푸스는 피부홍반루푸스보다 덜 흔하게 보고되었다. 프로톤펌프억제제 관련 전신홍반루푸스는 보통 비악물유발성전신홍반루푸스보다 더 가벼운 증세를 보인다. 전신홍반루푸스는 주로 젊은층의 성인부터 노인에 이르기까지 초기 약물 치료 후 수일에서 수년 이내에 발생한다. 대다수의 환자는 발진이 나타났으나, 관절통과 혈구감소증도 보고되었다.
- 위저선 용종(Fundic gland polyps)：프로톤펌프억제제 사용은 위저선 용종의 위험 증가와 관련이 있으며 특히 1년 이상 장기간 사용 시 위험이 증가한다. 프로톤펌프억제제를 사용한 환자 중 위저선 용종이 발생한 대부분의 환자들은 무증상이었으며 내시경 감사를 통해 우연히 발견되었다. 프로톤펌프억제제에 치료하고자 하는 증상에 맞게 최 기간 사용해야 한다.
- 중증 피부 이상 반응：프로톤펌프억제제 사용 시 스티븐스존슨증후군(SJS), 독성 표피 괴사 용해(TEN), 호산구 증가 및 전신 증상 동반 약물 반응(DRESS증후군) 및 급성 전신 피진성 농포증(AGEP)을 포함한 중증 피부 이상반응(SCARI)이 보고되었다. 중증 피부 이상 반응의 최초 징후 또는 과민반응이 나타나면 이 약 투여를 중단하고 추가적인 평가를 고려해야 한다.
- 상호작용
 - 이 약 투여 중 위내 산도 감소로 인해 위 산도에 의해 흡수 기전이 영향을 받는 약물의 흡수가 증가 또는 감소될 수 있다. 다른 산 분비 억제제나 제산제와 마찬가지로 이 약 투여 중에는 케토크나졸과 이트라코나졸 및 델로리다닐의 흡수가 감소될 수 있고 다국산의 흡수가 증가할수 있다. 건강한 지원자들에게서 오메프라졸(하루에 20mg)과 다국산의 동시투여는 다국산의 생체이용률을 10%정도 증가시켰다(10명의 지원자들 2명은 30%까지 증가). 이 약은 오메프라졸의 이성질체이다. 따라서 이 약을 다국산과 병용투여시 환자의 상태는 모니터링 되어야 한다.
 - 이 약은 CYP2C19과 CYP3A4에 의해 대사된다. 그리고 이 약은 이 약의 주 대사효소인 CYP2C19을 저해한다. 디아제팜, 시탈로프람, 이미프라민, 클로미프라민, 페니토인, 외로파린 등과 같이 CYP2C19에 의해 대사되는 약물과 병용시 이들 약물의 혈청 농도가 증가될 수 있으므로 이들 약물의 감량이 절감될 수 있다. CYP2C19 기질인 디아제팜과 이 약 30mg의 병용투여로 디아제팜의 혈중농율이 45 % 감소되었다. 간질환자에게 페니토인과 이 약 40mg의 병용투여로 페니토인의 혈중농도 최저치가 13 % 증가되었다. 이 약을 투여하기 시작하거나 중단 할 때 페니토인의 혈청 농도를 모니터링하도록 한다. 오메프라졸(1일 1회 40mg 투여)은 종지코나졸(CYP2C19 기질)의 Cmax와 AUC를 각각 15% 및 41% 증가시켰다. 임상시험에서 외과과관을 투여하고 있는 환자에게 이 약 40mg을 병용 투여하였을 때 평균 시간은 정상 범위에 포함되었다. 그러나 시판 후 조사에서 두 약물을 병용투여하는 동안 임상적으로 유의한 INR과 프로토허민 시간의 상승이 몇 건 보고되었으며 이는 비정상적출혈과 심지어 사망까지 초래할 수 있다. 그러므로 외과로인 또는 다른 쿠마린 유도제와 이 약과의 병용투여를 시작하거나 중단할 때 모니터링이 필요하다.
 - 이 약은 CYP2C19과 CYP3A4에 의해 대사된다. 이 약과 CYP3A4 저해제인 클레리트로마ixin(500mg 1일 2회 투여)을 동시 투여하면 이 약의 AUC가 2배로 증가된다. 이 약과 CYP2C19, CYP3A4 저해제와의 병용투여는 이 약의 노출을 두 배 이상 증가시킬 수 있다. CYP2C19, CYP3A4 억제제인 비리코나졸은 오메프라졸의 AUC를 280%까지 증가시켰다. 이 때문에 이 약의 용량을 조절할 필요는 없다. 그러나 중증의 간기능 장애환자와 장기간의 치료가 필요한 환자에서는 용량조절을 고려하여야 한다.
 - CYP2C19나 CYP3A4 혹은 두가지 모두(예, 리람피산과 세틴토존수트) 유도당하고 알려진 약물들은 에스오메프라졸 대사를 증가시킬으로써 에스오메프라졸 혈청 농도를 감소시킬 수 도 있다. 이 약과 리람피산 또는 세틴토존수트의 병용투여를 피한다.
 - 이 약 뿐만 아니라, 오메프라졸도 CYP2C19의 억제제로써 적용한다. 고차원기에서 건강한 지원자에게 40mg의 오메프라졸을 투여한 경우 실스타트론의 Cmax와 AUC가 각각 18%와 26% 증가하였고 실스타트론의 활성 대사체 중 하나의 Cmax와 AUC는 각각 29%와 69% 증가하였다.
 - 건강한 지원자에게 오메프라졸(40 mg 1회 1회 투여)과 아타자나비르 300mg/리토나비르 100mg을 병용투여했음에 아타자나비르의 노출이 감소했다(AUC, Cmax, Cmin이 약 75% 감소). 아타자나비르 400mg 1일 4회 투여는 오메프라졸의 아타자나비르 노출에 대한 영향을 상쇄시킬 수 없다. 이 약을 포함한 프로톤펌프억제제들은 아타자나비르와 병용투여할 수 없다.
 - 오메프라졸은 몇 개의 항 바이러스제와 상호작용이 있는 것으로 보고되었다. 이 보고된 상호작용 및 임상적 중요성과 기전은 밝혀지지 않았다. 오메프라졸 투여시의 위내 산도 감소는 항 바이러스제제의 흡수를 변화시킬 수 있다. 가능한 상호작용의 또 다른 기전은 CYP2C19이며, 아타자나비르 및 넴피나비르와 같은 항바이러스제에서는 오메프라졸과 병용 투여시 혈청수치 감소가 보고되었으며 병용투여는 권장되지 않는다. 그 외 사쿠나비르와 같은 항바이러스제제에서는 혈청수치 증가가 보고되었다. 오메

- 프라졸과 병용 투여시 혈청수치가 변하지 않는 항바이러스제 제제 또한 존재한다. 오메프라졸과 에스오메프라졸은 유사한 약력학/약동학적 특성을 갖고 있으므로 아타자나비르 및 넴피나비르와 같은 항바이러스제제 약물과 병용투여해서는 안된다.
- 건강한 지원자에게 시사프리드와 이 약 40mg을 병용투여했을 때 시사프리드의 AUC가 32% 증가되고 배설 반감기가 31% 연장되었으나, 최고 혈청 농도의 유의한 증가는 없었다. 이러한 상호작용으로 상당 진정성리에 대한 시사프리드의 영향이 변경되지 않았다. 즉, 시사프리드 단독 투여에 의한 QTc 간격의 감소한 연장 외에 이 약과 시사프리드의 병용투여에 의해 더 이상 QTc 간격이 연장되지는 않았다.
- 이 약은 이목사실린 또는 케티딘의 약물동력학에 임상적으로 유의한 영향을 미치지 않았다.
- 이 약과 나프록센 또는 로페록시브의 병용 투여를 단기간 평가한 시험에 의하면 임상적으로 연관있는 약동학적 상호작용이 나타나지 않았다.
- 건강한 지원자로부터의 연구결과로부터 클로피도그렐(초용량용 300mg/ 유지용량1일 75mg)과 에스오메프라졸(경구투여 1일 40mg)은 약동학/약력학적인 상호작용이 있는 것으로 보여졌으며, 이것은 평균 14% 정도 혈소판 용집을 감소시키는 것으로 보여졌으며 클로피도그렐의 활성 대사체의 노출을 평균 40% 정도 감소시키는 것으로 나타났다. 이 결과에 근거하여 에스오메프라졸과 클로피도그렐는 병용투여하지 않도록 한다.
- 이상반응 사례 보고, 집단단위적 연구(population pharmacokinetic studies) 및 후향적 연구 등에서 메토트렉세이트(주로 고용량을 사용하는 경우, 메토트렉세이트의 사용상의 주의사항 참조)와 프로톤펌프억제제를 병용하는 경우 메토트렉세이트 그리고/또는 그 대사체인 히드록시메토트렉세이트의 혈청 농도가 상승 및 유지되어 메토트렉세이트의 독성이 나타날 수 있다고 보고되었다. 그러나 고용량의 메토트렉세이트와 프로톤펌프억제제에 대한 정식 약물상호작용연구는 수행되지 않았다(일반적 참조 우함 참조).
- 이 약과 타크로리마신을 병용하면 타크로리마신의 혈청치가 증가할 수 있다.
- 헬리코박터필로리 박멸을 위한 항생제병용요법：클레리트로마ixin 및/또는 에리트로마이신을 피오지드와 병용 투여시 심부정맥(QTc정, 심실성 빈맥, 심실세동, Torsades de pointes 포함)이 나타나고 이는 클레리트로마ixin 및 에리트로마ixin에 의해 이들 약물의 간다제와 방해 받을 수 있다. 이 약을 최소용량 및 적절한 치료기간으로 투여하여야 한다.
- 이 약과 리비비린의 병용 시 리비비린의 혈청농도가 감소할 수 있으므로(위양 pH 증가) 병용 투여해서는 안된다. 이는 리비비린의 치료효과를 저하시킬 수 있다.
- 임부에 대한 투여
이 약의 임신 중 노출에 대한 데이터는 제한되어 있다. 동물실험 결과 배태/발달과 관련하여 즉：간접의 영향은 나타나지 않았다. 라세티미 혼합물의 동물실험 결과 임신, 분만 또는 분만 후 발달에 대한 즉：간접의 유해작용도 나타나지 않았다. 그러나 이 약을 임부에 처방시 주의해야 한다.
- 수유부에 대한 투여
이 약이 사람의 모유 중으로 이행하는지 여부는 알려져 있지 않다. 수유부를 대상으로 한 시험은 실시되지 않았으므로, 이 약을 수유 중 투여해서는 안된다.
- 과광 투여시의 처리
계획된 과광투여(240mg/day용량의 제한된 경험)와 관련하여 나타나는 증상들은 일시적이다. 이 약 80mg을 1회 투여한 경우 전두는 문제가 없었다. 특이적인 해독제는 알려져 있지 않다. 이 약은 단박결함율이 아주 높기 때문에 투석되지 않는다. 따라서 과광투여시 대증요법 및 일반 유지요법을 사용하여야 한다.
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.
- 의약품동등성시험 정보^{*)}

- 시험약 에스졸정40mg일리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물[진양제약주])과 대조약 복시용 40mg일리그램(에스오메프라졸마그네슘)[한국아스트라제네카(주)]를 2X2 교차시험으로 각 1정씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구 투여하여 67명의 혈중 에스오메프라졸을 측정한 결과, 비교평가항목치(AUC_t, C_{max})를 로그변환하여 통계처리하였는데, 평균치 치의 90% 신뢰구간이 log 0.8에서 log 1.25 이내로써 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

시험약 에스졸정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)[진양제약주]과 대조약 넥시움정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘)[한국아스트라제네카(주)]를 X2,20교차시험으로 각 1정씩 건강한 성인에게 금식 시 만회 경구 투여하여 67명의 혈중 에스오메프라졸을 측정한 결과, 비교평가항목치(AUC _t , C _{max})를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 치의 90% 신뢰구간이 log 0.8에서 log 1.25 이내로 서로 생물학적으로 동등함을 입증하였다.					
구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-12hr} (ng·hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	넥시움정40밀리그램 (에스오메프라졸마그네슘) [한국아스트라제네카(주)]	3840 ± 1862	1412 ± 539	2.33 (1.00~6.00)	1.39 ± 0.34
시험약	에스졸정40밀리그램 (에스오메프라졸마그네슘삼수화물) [진양제약주]	3914 ± 2034	1492 ± 609	2.33 (0.33~8.00)	1.41 ± 0.37
90% 신뢰구간 ^{*)} (기준: log 0.8 ~ log 1.25)		log 09484 ~ 1.0715	log 0.9400 ~ 1.1346	-	-
(AUC _t , C _{max} , t _{1/2} : 평균값±표준편차, T _{max} : 중앙값(범위), n=67)					
AUC _t : 투약시간부터 최종혈중농도 정상시간 1까지의 혈중농도-시간곡선하면적					
C _{max} : 최고혈중농도					
T _{max} : 최고혈중농도 도달시간					
t _{1/2} : 말단 소실 반감기					
*)비교평가항목치를 로그변환한 평균치 치의 90%신뢰구간.					

- 의약품동등성시험(기준 제7조제2항)에 따라, 시험약 에스졸정20mg일리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)[진양제약주])은 대조약 에스졸정40mg일리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)[진양제약주])과 비교용량시험자료를 제출하였으며, 대조약과 용량상성이 동등하였다. 이에 따라 해당 자료로서 생물학적동등성을 입증하였다.

- 이 약은 진양제약주) 에스졸정20mg일리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물), 에스졸정40mg일리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전공정을 진양제약주)에 위탁 제조하였음.

■저장방법：기밀용기, 실온(~30℃)보관

■사용기한：케이S 표시일까지

■포장단위：28정/상자(14정/Alu-Alu x 2)

- 본 약품들은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- 이 첨부문서 작성일(2023.12.05)이후 변경된 내용은 홈페이지 https://jevak.co.kr이나 소비자상담실 (080-010-55110)로 문의 또는 식품의약품안전처 의학약품통합정보시스템 (https://nedrug.mfds.go.kr)을 참조하십시오.
- 부작용보고 및 피드백제출처：한국약물안전관리센터(1644-6223, 14-3330)

■제조외자：오스틴제약주)

경기도 안산시 단원구 상곡로 146번길 20

■제조자：진양제약주)

강원특별자치도 원주시 지정면 신평로 34