

041019

Acne Treatment 클리톡® 외용액2%(살리실산)

클리톡 외용액 2% 제품정보

클리톡 외용액 2%의 주성분인 살리실산(salicylic acid)은
첫째, 모공 깊숙이 침투되어 여드름의 원인균 P.acnes의 증식을 막을 수 있습니다.
둘째, 항염증 효과가 있어 비염증성, 염증성 여드름의 치료에 도움이 될 수 있습니다.
셋째, 각질세포 간의 응집을 감소시켜 모공을 막는 피부 표면의 각질을 제거합니다.
넷째, 여드름의 초기 병변(병에 의한 몸의 변화)인 면포(여드름)에 효과가 있어 염증성 여드름으로의 진행을 예방해줍니다.

Ref. Acne and its Therapy, Auckland: Informa Healthcare, 2007

【원료약품 및 그 분량】 100g 중

유효성분 : 살리실산(EP) 2g

기타 첨가제 : 박하유, 수산화나트륨, 시트르산수화물, 에탄올96%, 정제수, 프로필렌글리콜

【성상】 박하향을 가진 무색의 투명한 액

【효능·효과】 여드름 치료

【용법·용량】 1일 2회 아침, 저녁으로 바른다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자(부위)에는 사용하지 말 것
 - 이 약에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
 - 당뇨병 환자
 - 혈액순환장애 환자
 - 눈 주위 및 점막
 - 감염, 염증, 발적(충혈되어 붉어짐) 또는 자극이 있는 부위
- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것
 - 약물 또는 화장품 등에 의해 알레르기 증상(예 : 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 붓 등)에 의한 피부염)의 병력이 있는 환자
 - 신부전 환자(살리실염이 피부에 대량 흡수될 경우 중독을 유발하므로 신부전 환자에는 광범위한 피부에 장기간 적용하지 않는다.)
 - 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것, 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
 - 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 홍반, 가려움이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
 - 대량 장기간 연용(계속 복용)(사용)시 피부염, 피부궤양이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.

- 3) 이 약이 정상 피부에 닿았을 경우에는 국소 자극 반응이 나타날 수 있으며 이러한 반응이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
- 4) 수 회(여러 차례) 사용하여도 증상의 개선이 나타나지 않을 경우에는 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

4. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항

- 1) 이 약은 외용으로만 적용하고, 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 화농성피부염, 습윤, 미란(긁힘)의 경우에는 이를 미리 치료한 후 이 약을 적용한다.
- 3) 광범위 병소(아픈 부위)에 적용하는 경우에는 부작용이 나타나기 쉬우므로 주의하여 사용한다.
- 4) 환부(질한 부위) 이외의 피부에 닿지 않도록 주의한다.
- 5) 눈, 코, 입 및 다른 점막에 닿지 않도록 주의하여 적용한다. 실수로 눈에 들어갔을 경우에는 충분한 양의 물로 완전히 씻어낸 후 의사의 지시에 따른다.
- 6) 실수로 이 약을 복용한 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 7) 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 가) 이 약을 경구투여한 동물실험에서 기형발생작용이 보고된 바 있으므로 이 약을 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
 - 나) 이 약이 모유로 배출된다는 보고가 있으나 영아에 미치는 영향은 알려져 있지 않다.
 - 다) 수유부에 투여 시 유방 부위에 적용하지 않는다.
- 8) 소아에 대한 투여
 - 가) 소아에 투여 시 보호자의 지도·감독 하에 사용한다.
 - 나) 소아는 부작용이 나타나기 쉬우므로 대량을 광범위한 부위에 적용하거나 장기간 사용하지 않는다.
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 가능한 한 서늘한 곳에 보관한다.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.
 - 4) 화기 근처에 두지 않는다.
 - 5) 사용하지 않을 경우에는 뚜껑을 잘 닫아둔다.

【포장단위】 40mL/병

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr> → 의약품이상사례보고)에 알리도록 하십시오.
※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품 정보 참조
※ 민원, 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변태 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.

**부광약품주식회사**

제조의뢰자 : 부광약품(주) 경기도 안산시 단원구 능안로 47
제조자 : (주)부광 충남 천안시 서북구 백석공단1로 47

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통화료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다.
제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

☎ 소비자 상담실 : TEL 080-933-2233

◆ 홈페이지 : <http://www.bukwang.co.kr>

※ 이 첨부문서 작성일자(2019년 04월 10일)이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.