

티파리드정 (티로프라미드염산염)

원료약품 및 그 분량 1정 중

- 유효성분 : 티로프라미드염산염(별규) 100 mg
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물/소/우유
- 기타첨가제 : 옥수수전분, 포비돈, 전분글리콜산나트륨, 스테아르산마그네슘, 오파드라이헥셀(03B28796)

성상

흰색의 원형 필름코팅정

효능·효과

1. 다음 질환에서의 급성 경련성 동통 : 간담도산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장·요관의 산통
2. 다음 질환에서의 복부 경련 및 동통 : 위장관 이상운동증, 담석증, 담낭염, 수술 후 유착

용법·용량

성인 : 염산티로프라미드로서 1회 100 mg 1일 2~3회 경구투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 외부 자극으로 인해 위장관이 협착된 환자
- 2) 거대 결장, 허탈 환자
- 3) 이 약에 과민증 환자
- 4) 중증의 간부전 환자
- 5) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

항콜린작용을 나타내지 않지만 녹내장 또는 전립선비대 환자에는 신중히 투여한다.

3. 이상반응

- 1) 구갈, 구역, 구토, 변비 등이 나타날 수 있다.
- 2) 가려움, 홍반 등의 알레르기증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.

4. 상호작용

혈압강화약물을 투여받는 환자에게 이 약을 고용량 투여할 경우에는 혈압강화효과가 상승될 수 있으므로 주의한다.

5. 임부에 대한 투여

동물실험에서 임부나 태아에 대한 이상반응을 나타내지는 않았으나 임부의 사용은 필요성이 인정되는 경우로 제한하고 의사의 감독 하에 투여한다.

6. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

사용기간

제조일로부터 36개월

포장단위

30정/병, 100정/병

취급상의 주의사항

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과 하였거나 유통과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입하신 업체를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 본 의약품을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
- ※ 부작용보고 : 한국의약품안전관리원(☎1644-6223)
- ※ 최종수정일자(2019년 07월 26일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품 검색' 또는 문의(☎02-574-2541)에서 확인할 수 있습니다.

제조회사 : 정우신약(주) / 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 60

제조사 : (주)동구바이오제약 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 18(상신리 901-3)

판매자 : (주)에이프로젠H&G / 경기도 화성시 양감면 두머리길 18



정우신약(주)

APROGEN
(주)에이프로젠 H&G



동구바이오제약