

영진약품

마그네슘, 비타민D 800IU 함유 칼슘제

본투본

연질
캡슐

하루 1번 간편섭취

【원료의약품 및 그 분량】 1캡슐(820 mg) 중	
인산수소칼슘수화물(CaP)	620 mg
(캡슐으로서 144.40 mg, 연으로서 111.59 mg)	
글루콘산칼슘수화물(CaP)	100 mg
(캡슐으로서 8.94 mg)	
농축콜레칼시페롤(유상)(D3)	0.8 mg
(비타민D로서 800 IU)	
산화마그네슘(CaP)	10 mg
(마그네슘으로서 6.03 mg)	

【성상】

유백색의 유상 내용물을 함유한 입방체의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 D의 보충: 임신·수유기, 발육기, 노년기

- 이 약에 함유된 비타민 D의 효능·효과는 다음과 같다: 뼈, 이의 발육발달, 구루병의 예방

【용법·용량】

만 8세 이상 및 성인 1회, 1회 1캡슐 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하지 말 것.

① 고칼슘혈증(hypercalcemia): 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태 환자, 유육종증(sarcomas): 원인을 알 수 없는 전신
염종질환, 신장(콩팥)질환 환자

2. 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

3. 만 12개월 미만의 젖먹이

4. 신장(콩팥)결석 환자

5. 심한 중상의 신부전 환자

6. 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

7. 과민 또는 망령에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

① 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

① 만 1세 미만의 젖먹이

2. 의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이

4. 일부 및 임신하고 있는 가능성이 있는 여성, 수유부, 마취, 마약, 유아

① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.

5. 심장(콩팥)기능 장애 환자

6. 신장(콩팥)장애 환자

7. 저단백혈증 환자

8. 갑상선장애를 투여 중인 환자

9. 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자

10. 임부

11) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 해장염 등 지방대사 이상 환자 또는 저칼슘 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

① 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심장동맥구축, 피부발진,
붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하

2. 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(붓기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

3. 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.

4. 항알도스테론제, 트라임타렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.

5. 우발적으로 과량복용 한 경우

6. 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

① 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것

2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.

3) 녹차, 홍차 등 탄산을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자(예를 들어 이 약을 투여할 때 혈당 지장치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해
지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 경우용 지장제를 동시에
투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 존재하여 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

① 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 열 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 60 Cap(10 Cap / PTP x 6)

120 Cap(10 Cap / PTP x 12)

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【소비자 상담실】 080-990-8200

【홈페이지】 www.yungin.co.kr

【제조지】 ㈜알파바이오 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

【제조외 및 판매처】 영진약품공업㈜ / 경기도 화성시 남양읍 무리로 66

【제조외 및 판매처】 영진약품공업㈜ / 경기도 화성시 남양읍 무리로 66

【제조외 및 판매처】 영진약품공업㈜ / 경기도 화성시 남양읍 무리로 66

【제조외 및 판매처】 영진약품공업㈜ / 경기도 화성시 남양읍 무리로 66

【제조외 및 판매처】 영진약품공업㈜ / 경기도 화성시 남양읍 무리로 66

【제조외 및 판매처】 영진약품공업㈜ / 경기도 화성시 남양읍 무리로 66

【제조외 및 판매처】 영진약품공업㈜ / 경기도 화성시 남양읍 무리로 66

【제조외 및 판매처】 영진약품공업㈜ / 경기도 화성시 남양읍 무리로 66

【제조외 및 판매처】 영진약품공업㈜ / 경기도 화성시 남양읍 무리로 66

【제조외 및 판매처】 영진약품공업㈜ / 경기도 화성시 남양읍 무리로 66

【제조외 및 판매처】 영진약품공업㈜ / 경기도 화성시 남양읍 무리로 66

【제조외 및 판매처】 영진약품공업㈜ / 경기도 화성시 남양읍 무리로 66

【제조외 및 판매처】 영진약품공업㈜ / 경기도 화성시 남양읍 무리로 66

【제조외 및 판매처】 영진약품공업㈜ / 경기도 화성시 남양읍 무리로 66

【제조외 및 판매처】 영진약품공업㈜ / 경기도 화성시 남양읍 무리로 66

【제조외 및 판매처】 영진약품공업㈜ / 경기도 화성시 남양읍 무리로 66

【제조외 및 판매처】 영진약품공업㈜ / 경기도 화성시 남양읍 무리로 66

【제조외 및 판매처】 영진약품공업㈜ / 경기도 화성시 남양읍 무리로 66

문서 최초일: 2016년 08월 4일 | 문서 작성일: 2017년 02월 02일