

[원료약품 및 그분량] 1정(535mg) 중

- 유효성분: 알마게이트(KP) 500밀리그램
- 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산나트륨, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드성아산화규소

[성상] 흰색의 원형 정제

[효능·효과]

다음 질환의 증상완화 및 증상의 개선: 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다, 속쓰림, 구역, 구토, 위통, 신트림

[용법·용량]

성인 및 12세 이상의 소아: 알마게이트로서 1회 1g을 1일 3회, 식후 30분~1시간에 씹어서 경구 복용한다.

필요시 취침 전에 1회 더 복용할 수 있다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성 성분에 대해서 과민반응이 있는 환자
- 2) 알츠하이머병 환자 3) 치질 환자 4) 체액저류(부기) 환자
- 5) 임신 중독증 환자 6) 설사 환자 7) 진단되지 않은 소화기관 출혈 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

테트라사이클린계 항생물질(함께 복용시 흡수를 억제할 수 있음)

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 다른 약물을 복용하고 있는 사람: 이 약의 흡착작용 또는 소화관내체액의 pH 상승에 의해 함께 복용하는 약물의 흡수·배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 복용한다.
(1) 비스테로이드소염진통제(NSAID), 궤양 치료제, 디기탈리스 제제, 클로로프로마진, 란소프라졸, 프레드니솔론, 페니실린, 퀴놀론, 철(Fe)염 제제: 흡수를 감소시킬 수 있으므로 2~3시간 간격을 두고 복용한다. (2) 살리실산염: 신장의 배설을 증가시킨다.
- 2) 신장에 환자: 마그네슘 또는 알루미늄이온이 오랜 기간 동안에 걸쳐 콩팥에 축적될 수 있다.
심한 신장에 환자에게는 권고되지 않는다.
- 3) 신체 허약자, 인함량이 낮은 식이요법 실시자, 소화 흡수 장애가 있는 사람: 이 약의 알루미늄염이 인 흡수를 감소시키므로 장기간 복용할 경우, 혈중 인산염함량 감소 및 뼈의 무기질 침착장애를 야기할 수 있음.
- 4) 고령자
- 5) 혈액구도 또는 흑색대변 등과 같은 소화기관 출혈 증상이 있는 환자
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부



위염, 위·십이지장 궤양 치료제

중헌 알마게이트 정

(알마게이트)

Joonghun
Almagate Tab.
(Almagate)

500정

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상담 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 소화기계: 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사
- 2) 2주 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
- 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

[저장방법 및 사용기간] 밀폐용기, 실온보관(1~30°C), 제조일로부터 36개월

[제조자] (주) 중헌제약, 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 28 공장동

※ 제품을 사용한 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국 의약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해 구제 신청을 할 수 있습니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어오십시오.

<(주) 중헌제약: 02-6928-9114>

※ 의약품 통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr/searchDrug>) 참조



HDPE
투명: LDPE

개정년월일: 2025.10.24 M2019-V04

55.5x20