

하이비스정

한국맥넬티(주)

이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어보시고 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

하이비스정

전문의약품 분류번호 : 232

[제품명] 하이비스정

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

라니티딘염산염(KP)	168.0mg
비스무트트리수산화물(KP)	200.0mg
수크랄페이트수화물(KSP)	600.0mg

* 첨가제(타르색소) : 황색 203호, 청색 2호

[성상] 연두색의 장방형 필름코팅정제

[효능·효과] 위 · 십이지장궤양, 위염, 궤양가-엘리슨증후군, 역류성식도염, 마취전 투약(엔페론증후군 예방), 수술후 궤양, 비스테로이드소염진통제(NSAID)로 인한 위 · 십이지장궤양

[용법·용량]

1. 성인

보통 식사와 무관하게 1회 1정을 1일 2회 오전 및 취침전에 경구투여한다.

1) 위 · 십이지장 궤양

1회 1정을 1일 2회 투여하거나 1회 2정을 1일 1회 취침전에 투여한다. 특히 십이지장궤양환자에 대해서 1회 2정 1일 2회 오전 및 취침전에 투여하면 보다 높은 치료율을 얻을 수 있다. 비스테로이드소염진통제 투여로 인한 궤양 또는 비스테로이드소염진통제 장기 투여시 위 · 십이지장궤양발생을 예방하기 위한 병용 요법에 있어어도 용량은 같다. 보통은 4주 이내 비스테로이드소염진통제 투여로 인한 질환은 보통 8주 이내에 치유되나 간혹 환자에 따라 치유 기간이 연장 될 수도 있다. 이 약의 단기요법에 효과 가 우수하였던 재발성 궤양환자들에 대해서는 유지요법에 1회 1정을 1일 1회 취침전에 투여한다.

2) 역류성 식도염

8주 동안 1회 1정, 1일 2회 투여하거나 1회 2정을 1일 1회 취침전에 투여한다. 단 중증 역류성 식도염환자에 대해서는 1회 2정을 1일 4회로 증량할 수 있다.

3) 줄링가-엘리슨 증후군

초기용량으로 1회 1정을 1일 3회로 치료를 시작하여 필요에 따라 증량할 수 있다. 중증질환의 경우 의사의 지시에 따라 1일 라니티딘으로서 6 g까지 부여 할 수 있다.

4) 소화성 궤양, 급성 스트레스성 궤양 및 급성 위염과 병변에 의한 상부소화관 출혈

경구 투여가 가능하지만 주사에서 경구투여로 전환하여 1회 1정을 1일 2회 투여한다.

5) 마취전 투약(엔페론증후군 예방)

마취유도 2시간 전에 1회 1정을 투여한다. 이 경우 수술전에도 1회 1정을 투여하면 더욱 좋다.

[사용상 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 투석요법을 받고 있는 환자

2) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응의 병력이 있는 환자

3) 급성 포르피린증 병력이 있는 환자(라니티딘염산염이 급성 포르피린성 발작을 유발할 수 있음을 시사하는 임상 보고가 드물게 있다)

4) 신장애 환자

5) 상부 위장관 수술 환자

6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

7) 미숙아, 신생아

8) 칼륨 제한 식이요법 환자

2. 다음의 경우에는 신중히 투여할 것.

1) 간장애 환자

2) 약물 과민반응의 병력이 있는 환자

3) 고령자

4) 신장애의 병력이 있는 환자

5) 비스테로이드소염진통제를 병용 투여하고 있는 환자(특히 고령자 및 소화궤양의 병력이 있는 환자에서 이 약과 병용 투여할 경우 주기적인 관찰이 필요하다)

6) 이 약은 위안 증상을 은폐할 수 있으므로 특히, 위궤양 환자, 새끼개 또는 최근 변화된 소화불량증상을 보이는 중년 이상의 환자는 치료전에 악성인 아닌 것을 확인한 후 투여한다.

7) 헬리코박터 파일로리 양성인 위 · 십이지장궤양 환자 : 세균박멸을 위한 노력이 필요하다.

8) 중증의 증한자실 환자(수크랄페이트 투여 후 위액의 생성이 보고되었다)

9) 저인산혈증 환자(수크랄페이트의 일부가미늄은 소화관 내에서 인산염과 결합하여 흡수를 저해한다)

10) 삼킨과관 환자(수크랄페이트 투여 후 호흡기 합병증이 보고되었다)

3. 이상반응

이상반응 발현 빈도는 다음과 같이 분류된다. : 매우 흔하게 ($\geq 1/10$), 흔하게 ($\geq 1/100$, $< 1/100$), 흔하지 않게 ($\geq 1/1,000$, $< 1/100$), 드물게 ($\geq 1/10,000$, $< 1/1,000$), 매우 드물게 ($< 1/10,000$)

1) 소크 : 매우 드물게 아나필락시스 소크가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 주의 깊게 관찰하고 만약 이러한 증상이 나타난 경우 투약을 중지 하고 적절한 조치를 하여야 한다. 이들 반응은 단회 투여 후에 보고되었다.

2) 과민반응 : 드물게 피부발진, 두드러기, 혈관신장부종, 발열, 기관지경련, 저혈압, 홍통 등의 과민반응, 혈관부종 등의 증상이 나타날 수 있다. 이러한 증상 이 나타난 경우에는 투약을 중지한다. 이들 반응은 단회 투여 후에 보고되었다.

3) 혈액계 : 몇몇 환자에서 과립구감소증이 보고된 바 있으나 가역적이며 매우 드물게 가역적인 백혈구 감소, 혈소판 감소가 나타날 수 있고 혈청 효소치 상승(혈청 크레아티닌, 혈청 아미노전달효소)이 나타날 수 있다. 드물게 무과립구증, 범혈구감소증이 보고되었고 범혈구감소증이 나타난 환자에게 가끔

골수형성저하증 또는 골수무형성증, 재생불량성 빈혈이 함께 보고되었다. 매우 드물게 후천성 면역결핍성빈혈이 나타날 수 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 투약을 중지한다. 흔하지 않게 호산구 증가가 나타날 수 있다. 초기증상으로 전신권태감, 두력, 피하 · 점막하 출혈, 발열 등이 나타나면 혈액검사를 실시하여 이 상이 인정되는 경우에는 즉시 투약을 중지하는 등 적절한 조치를 한다.

4) 간장 : 드물게 일시적이고 가역적인 AST · ALT · r-GTP · ALP의 상승이 나타날 수 있고 매우 드물게 가역적인 황달성 또는 비황달성 간염(간세포성, 간소관 성 또는 혼합형) 등 간기능장애가 나타날 수 있다. 이러한 증상이 나타날 경우에는 즉시 투약을 중지한다.

5) 순환기계 : 다른 H2 수용체 길항제와 마찬가지로, 매우 드물게 빈맥, 서맥, 방실차단, 조기심실수축과 같은 부정맥이 보고되었다. 매우 드물게 혈관염이 보고 되었다.

6) 소화기계 : 흔하지 않게 구역, 구토, 변비, 설사, 복부팽만감, 복통, 드물게 식욕부진의 증상이 나타날 수 있다. 대변색이 변색 또는 검은색으로 되나 이는 창자 에서 비스무트삼하이드 황상에 기인되는 것으로 별도로 치료할 필요가 없다.

7) 정신신경계 : 매우 드물게 어지럼, 졸림, 가역성의 착란상태, 경련, 혼돈, 불면, 두통(때때로 중증), 두통감, 병감, 불안, 주로 중증 및 고령자에서 가역적 정신혼 등, 우울증 및 환각 등의 증상이 나타날 수 있다. 매우 드물게 조울병으로 추정되는 가역적인 호전 시력과 불수의 운동장애가 보고 된 바 있다. 의식장애, 경련(간질성 등), 간대성 근경련이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 투약을 중지하거나 적절한 조치를 한다. 특히 신기능 장애를 지니고 있는 환자에서 쉽게 나타날 수 있으므로 주의한다.

8) 내분비계 : 매우 드물게 여성형유방 및 유방분비과다와 같은 유방관련 증상 및 상태, 가역적인 발가부진 및 성욕박탈 등이 보고된 바 있으나, 이 약과의 인 과 관계는 확립되지 않았다.

9) 근골격계 : 매우 드물게 관절통 및 근육통이 나타날 수 있다. 근육통, 무력감, 크레이틴키나아제(CK) 상승, 혈중 및 요중 미오글로빈의 상승을 특징으로 하는 횡문근융해증이 나타날 수 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 투약을 중지한다.

10) 피부 : 드물게 피부발진 매우 드물게 경미한 다형홍반 및 탈모증이 보고된 바 있다.

11) 기타 : 드물게 설염, 흔하지 않게 피부가려움이 나타날 수 있다. 간혹 허가 갠게 되기도 하나 저절로 정상화된다. 기타 H2 수용체 길항제에서 피부점막인중 후균(슈트르스-존슨 증후군), 독성표피괴사증(스테벤스 증후군), 재생불량성빈혈, 방실차단 등의 심차단, 매우 드물게 급성 간질성 신염 이 나타났다는 보고가 있다.

4. 일반적 주의

1) 장기연용을 하지 않는다.

2) 치료시 경과를 충분히 관찰하고 증상이 상용하여 치료량을 사용하도록 하고 이 약의 효과가 없는 경우에는 다른 약물로 교체한다. 또한 혈액상, 간 기능, 신기능 등에 주의한다.

3) 고령자, 만성 폐질환, 당뇨병, 면역이 약화된 환자에서 유행성 폐렴의 발병 위험도가 증가할 수 있다. 대규모 역학 연구에서 H2 수용체 길항제를 복용하는 환 자는 치료를 중단한 환자보다 유행성 폐렴 발병의 상대 위험도가 1.63이었다(95 % CI, 1.07 ~ 2.48).

4) 이 약을 투여하고 어지럼이나 졸음의 경향이 있는 환자는 운전이나 위험한 기계의 조작을 피한다.

5. 상호작용

1) 라니티딘은 다른 약물의 흡수, 대사 또는 신배설에 영향을 줄 수 있다. 이러한 약동학적 변화로 영향 받는 약물의 용량 조정 또는 투여 증지가 필요할 수 있다. 상호작용은 다음과 같은 몇몇 기전에 의해 발생된다. :

(1) CYP-450과 관련된 복합기능용기나이제계의 억제 : 일반적 치료 용량에서, 라니티딘은 이 효소계에 의해 비활성화되는 약물(예, 디아제팜, 리도카인, 페니 토인, 프로프라놀롤, 테오필린)의 작용을 증가시키지 않는다. 쿠마린 항응고제에, 와로파린과 병용투여 시 프로트롬빈 시간의 변화가 보고된 바있다. 쿠 마린 항응고제의 치료 지수가 좁기 때문에, 라니티딘과의 병용투여 기간에는 프로트롬빈 시간의 증가 또는 감소를 면밀하게 모니터링한다.

(2) 신세뇨관 분비 경쟁 : 라니티딘은 일부 약이온계로 제거되기 때문에, 동일 경로로 제거되는 다른 약물의 청소율에 영향을 줄 수 있다. 라니티딘 고용량(예, 줄링가-엘리슨 증후군 치료 시)은 프로카이아미드 및 N-아세틸프로카이아미드의 배설을 감소시켜 이들 약물의 혈장 농도를 증가시킬 수 있다.

(3) 위 pH의 변화 : 어떤 약물의 생체이용률이 영향을 줄 수 있으며, 이는 흡수 증가(예, 트라이클로, 미다졸람, 클리피지드) 또는 흡수 감소(예, 케토코나졸, 이타 자나비르, 엘라비르인, 케피타나브)를 유발할 수 있다.

2) 라니티딘이 이복사실린, 메트로니다졸과 상호작용을 일으킨다는 증거는 없다.

3) 수크랄페이트는 뉴퀴놀론계 항균제(시프로플록사신염산염, 노르플록사신 등), 디ாக신, 페니토인, 테트라사이클린, 테오필린 등과 동시에 복용함으로써 병용 약제의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용약제 투여후 급격히 2시간 이상 시간간격을 두고 투여한다.

4) 비스무트트리수산화물은 제산제에 의해 효과가 감소될 수 있으므로 이 약 투여 전후 30분 동안에는 제산제를 투여하지 않는다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신 가능성이 있는 여성에는 투여하지 않는다.

2) 모유유으로 이행하므로 수유부에는 투여하지 않는다.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성과 유효성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직하다.

8. 임상검사치에 대한 영향

시합지법에 의한 요단백질에서 거짓양성이 나타날 수 있으므로 실험실실신으로 실험하는 것이 바람직하다.

9. 과립투여시의 처리

와국에서 1일 6 g(라니티딘으로서)까지 과립투여 보고가 있었으나 특히 중대한 영향은 나타나지 않았다. 이러한 경우에는 최초, 위세척을 행함과 동시에 적절 한 치료를 행한다. 필요한 혈액투석에 의하여 제거해도 좋다.

10. 기타

1) 라니티딘의 투여로 인해 위산의 분비가 줄고 위장 내 세균 증식이 촉진될 수 있다

2) 동물들의 흡수 배설시험에서 안구멜라닌과 친화성이 있다는 보고가 있으므로 장기투여시 안과적 검사를 행하는 등 주의하여 투여한다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 30정/병, 300정/병

[제조자] 한국맥넬티㈜ 중남 천안시 서북구 성환읍 울금3길 46

[판매자] ㈜이온파마 서울시 서초구 남부순환로 2495, 6층

[제조자]

McNulty
Pharmaceutical

[판매자]

EDEN PHARMA
Wherever, Whenever, Eden will be with you.

* 본 의약품은 KGMP적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 사용기간이 경과하였거나 유통과정 중 변질 · 변색 또는 오염 및 손상된 제 품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
* 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자상담실(031-378-1460) 또는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인할 수 있습니다.
최초작성일자 : 2016.08.10 HiB-1608-00