

프리번정

조 제 용 일반의약품

(건조수산화알루미늄겔/탄산마그네슘/옥세타자인)

【원료약품 및 그 분량】 1정(350mg)중

• 유효성분 : 건조수산화알루미늄겔(KP)	124.9밀리그램
(산화알루미늄으로서 62.45mg)	
탄산마그네슘(KP)	83.8밀리그램
(산화마그네슘으로서 35.20mg)	
옥세타자인(KP)	5.0밀리그램
• 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨	

【성상】 흰색의 원형 정제

【효능·효과】

위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 체할, 구역, 구토, 위통, 신트림

【용법·용량】

성인 1회 1정씩 1일 3회 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민반응의 병력이 있는 사람
- 2) 투석 요법을 받고 있는 사람
- 3) 고마그네슘혈증 환자
- 4) 고인산혈증 환자
- 5) 변비 환자
- 6) 장협착증 환자
- 7) 급성 충수염 환자
- 8) 임신초기 3개월 이내의 여성
- 9) 만 7세 미만의 소아

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

테트라사이클린계 항생제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
 - (1) 알루미늄 화합물을 함유한 약물과 다른 약제들을 동시에 복용할 때 약물의 재흡수 비율이나 정도가 증감될 수 있다. 이러한 약물로서 디곡신, 갑토프릴, 시메티딘, 파모티딘, 테오필린, 프로프라놀롤, 아테놀롤, 황산철, 클로르프로마진 등이 있고, 약물의 재흡수를 증가시키는 약물로는 아세틸살리실산, 나프록센, 메토프롤롤, 레보도파 등이 있다.
 - (2) 약물의 재흡수에 의한 영향을 피하기위해, 알루미늄이 함유된 제산제의 복용후, 1 ~ 2시간 이내에 다른 약물의 복용을 피한다.
 - (3) 임상적인 약물들의 상호작용은 다음과 같다.
 - ① 테트라사이클린 : 약물의 재흡수 감소
 - ② 시프로플록사신, 오픈록사신 : 약물의 재흡수 감소

③ 케토데옥시콜린산 : 약물의 재흡수 감소

④ 불화나트륨 : 약물의 재흡수 감소

⑤ 이소니아지드 : 약물의 재흡수를 변화시킨다.

⑥ 에녹사신, 노르플록사신, 레보티록신, 쿠마린유도체 : 약물의 재흡수를 억제한다.

⑦ 철 : 약물의 재흡수 감소

⑧ 클로르프로마진 : 약물의 재흡수를 변화시킨다.

⑨ 탄산염류 : 알루미늄의 재흡수를 증가시킨다.

2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부 : 이 약이 모유를 통해서 분배되는지 여부에 대해서는 알려진바 없다. 임신시 합병과 태자독성이나 기형발생은 보고된바 없다.

3) 고마그네슘혈증 또는 마그네슘 결핍경험이 있는 사람

4) 신장에 환자 및 신장환의 병력이 있는 사람 : 장기간 사용할 때 복용량의 규칙적인 조절이 필요하다(경 · 중등도 신장에 환자에게 마그네슘이 함유된 제산제를 사용할 경우 고마그네슘혈증이 발생할 우려가 있어 세심한 관찰이 필요하다. 만성신부전 환자의 경우 고알부민혈증이 발생할 수 있다).

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 소화기계 : 설사, 변비, 복부팽만
- 2) 과민반응 : 피부발진, 마비감
- 3) 인산염 결핍증
- 4) 고용량에 의한 고마그네슘혈증과 신부전
- 5) 고용량에 의한 구강건조감 또는 미각장애
- 6) 드물게 두통, 졸음, 어지럼, 무력감 등의 증상
- 7) 2주 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 복용할 때는 구내마비감 등을 남기지 않기위해 신속하게 삼킬 것.
- 3) 장기적으로 계속 복용하지 말 것.
- 4) 신경조직과 뼈조직에 알루미늄의 축적에 주의할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
- 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

【포장단위】 30 정/병, 500 정/병

【저장방법 및 사용기간】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【제조사】 (주)중헌제약, 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 28 공장동

※ 제품 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회 고시 “소비자분쟁해결기준”에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 제품을 사용한 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.

※ 첨부문서에 기재되어 있지 않은 부작용이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 식품의약품안전처에 알려십시오.

※ 사용(유효)기한이 경과한 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 첨부문서 개정년월일 이후의 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr/searchDrug>)에서 확인 하실 수 있습니다.

※ 제품관련 문의사항은 <(주)중헌제약 : 02-6928-9114>로 문의바랍니다.



중헌제약

개정년월일 : 2023.06.23
M2183-V01