

일반 의약품
분류번호 01310

유행성결막염 · 다래끼 치료제

프리티뷰벤틱 점안액



※ 첨부문서를 읽을 것, 첨부문서를 보관할 것

【원료약품 및 그 분량】 1mL 중

설파메톡사졸 (KP)	40mg
글리시리진산이칼륨 (KP)	1mg
클로르페니라민말레산염 (KP)	0.2mg
아미노카프로산 (BP)	20mg
첨가제 : (안정(화)제) 에데트산나트륨수화물, (완충제)붕사, 붕산, (pH조절제)수산화나트륨, (용제)주사용수	

【성 상】

황색 투명 용기에 든 무색 내지 약간 미황색의 투명한 점안액

【효능 · 효과】

결막염(유행성결막염), 다래끼, 눈꺼풀의 짓무름, 눈의 가려움

【용법 · 용량】

1일 3-6회, 1회 1-3방울 점안한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 눈의 통증이 심한 사람
 - 지금까지 설파제에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움, 구역, 발열 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 지금까지 안약에 의한 알레르기 증상(예를 들면 충혈, 가려움, 부종(부기), 발진, 충혈되어 붉어짐 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약의 투여에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
눈의 충혈, 가려움, 부종(부기) 등
 - 3, 4일동안 투여 후에도 증상이 좋아지지 않는 경우
- 기타 이 약의 사용시 주의사항
 - 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것
 - 장기간 계속하여 사용하지 말 것.
 - 다래끼인 경우에는 눈꺼풀을 비비거나 그 외, 눈에 자극을 가하지 않도록 주의할 것(또한 다래끼는 체질적으로 생기기 쉬운 경우가 있기는 하나, 피로나 수면부족 등으로 인해 체력이 저하된 때 생기기 쉬우므로 휴식과 수면을 충분히 취하도록 유의할 것).
 - 이 약은 점안용으로만 사용할 것.
 - 소프트콘택트렌즈의 장착액으로, 또한 소프트콘택트렌즈를 착용한 채 사용하지 말 것.
 - 용기의 끝이 눈꺼풀 및 속눈썹에 닿으면 눈곱이나 곰팡이 등에 의해 약액이 오염 또는 혼탁(흐림)될 수 있으므로 주의할 것. 또한 혼탁(흐림)된 것은 사용하지 말 것.
 - 오염을 방지하기 위해 가능한 공동으로 사용하지 말 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
 - 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【유효기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 14mL

※ 본 제품은 우수약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하시기 바랍니다.

※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하시기 바랍니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하시거나 화일약품(주) (02-564-2722)로 문의하시기 바랍니다.

제조의뢰자 : 화일약품(주) / 경기도 안산시 단원구 산단로67번길 156

제조사 : (주)바이넥스 / 부산광역시 사하구 다대로 368-3

작성년월일 : 2016년 09월 30일

FBO1609.01

SY-16-09

hwaill 화일약품(주)