

일반의약품
분류번호:231

목 아플때, 구내염에는~

이누쿨

인후스프레이액

(포비돈요오드)

[원료약품 및 그 분량] 100ml 중
포비돈요오드(USP) ----- 0.45g
(유효요오드로서 45 mg)

[성상] 바닐라의 향과 감미 및 약간의 점성이 있는 옅은 갈색의 액체

[효능·효과] 구강내(입안) 살균소독, 인두염, 후두염, 구내염(입안염), 발치(이를 뽑음) 후 및 구내(입안) 수술 후 살균소독, 구취증(입냄새)

[용법·용량] 1일 수회 적당량을 분사 도포한다(뿌린다).

[사용상 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 요오드 과민증 환자
- 2) 갑상선기능 이상 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 입안이 심하게 헐은 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
- 3) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용

- 1) 과민증 : 발진 등의 과민증상이 나타나는 경우에는 사용을 중단한다.
- 2) 구강(입안) : 때때로 구강(입안), 인두의 자극감, 드물게 구강(입안) 점막미란(진주름), 입안의 혈음등의 증상이 나타날 수 있다.
- 3) 소화기계 : 때때로 구역 등의 증상이 나타 날 수 있다.
- 4) 기타 : 드물게 불쾌감이 나타날 수 있으며, 소독용으로 이 약을 과량 사용시 요오드 독성이 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 지킨다.
- 2) 소아에 사용할 때에는 보호자의 지도, 감독하에 사용한다.
- 3) 구강(입안)용으로만 사용한다.
- 4) 발치(이를 뽑음)후 등 구강 창상(입안 상처)의 경우 혈액이 응고하여 출혈이 멎기 전에는 격렬한 양치를 피한다.
- 5) 드물게 속(아나필락시스(과민성))이 일어날 수 있으므로 사용후 갑자기 가려움, 부종(부기), 가슴쓰림 등과 동시에 안색蒼백, 수족냉감(손발이 차가움), 식은 땀, 숨가쁨 등의 중증의 증상이 나타나는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.

5. 적응상의 주의사항

- 1) 소아에 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의복 등에 묻은 경우 바로 세척하면 물로 쉽게 씻겨진다.
- 3) 직사광선을 피하여 보존한다.
- 4) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1 ~ 30℃)보관

[포장단위] 50 ml

[교환 및 제품문의]

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상에 드립니다.
※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
※ 첨부문서 최종 개정연월일(2016.09.06)이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다. ※ 부작용보고 : 한국약물안전관리원(1644-6223)

※ 쉬운 용어 표시 참고

1) 구내염 : 구내염(입안염)

첨부문서 최종 개정 연월일 : 2016.09.06
P11609-01

제조의뢰자 :  **일양바이오**
일양약품(주)계열회사
충청북도 제천시 바이오밸리 3로 8
소비자상담전화번호 : 02-570-3972
홈페이지 www.ilyangbio.co.kr

제조사 :  **Firson** (주)퍼슨
충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 47