

타겐 정

(빌베리건조엑스)

[성분·함량] 이 약 1정 중,
주성분 : 빌베리건조엑스(EP) 170.0mg
(총 안토시아닌으로서 60.0mg)

[성상]
갈색의 타원형 필름코팅정제

[효능·효과]
1. 당뇨병에 의한 망막병성 및 눈의 혈관장애 개선
2. 아맹증(밤에 잘 못보는 증상)

[용법·용량]
빌베리건조엑스로서 1회 170 mg을 1일 2 ~ 3회 식후에 복용합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응을 나타내는 사람
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(생식독성에 관한 충분한 동물 실험연구는 없으며, 사람에게 대한 잠재적인 위험성은 알려진 바 없으나 임부에게 투여할 때에는 주의를 기울여야 합니다.)
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 소화기계 : 경미한(가벼운) 속쓰림, 구역 등 위장장애

2) 피부 : 발진, 가려움

4. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관합니다.

3) 잘못된 사용을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 30정/병, 90정/병

※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 복용하십시오.

※ 구입시 유효기한/사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국 등의 개설자를 통하여 본사 영업부(TEL 031-781-9081/9)에서 교환하여 드립니다.

※ 기타 자세한 사항은 동봉한 설명서 또는 홈페이지를 참조하십시오.

※ 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 본사 영업부/개발부(TEL 031-781-9081/9) 또는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

※ 의사나 약사께서는 이상반응을 예방하고 올바른 약물 사용을 위해 약물사용 전 다음사항을 반드시 읽고 숙지하십시오.

1. 환자에게 투약하기 전 반드시 설명서를 주의깊게 읽고 필요한 사항은 환자에게 복약 지도 합니다.

2. 용법, 용량을 확인하고 투약하십시오.

3. 습기와 열원을 피하여 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.

4. 오용을 막고 품질의 보전을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

5. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

☎ 소비자 상담전화 : 080-022-2200

제조의회사 : **국제약품 [주]** 

경기도 안산시 단원구 산성로 47

<http://www.kukjepharm.co.kr>

제조자 : (주)마더스제약

경북 경산시 진량읍 공단6로24길 18

작성일: 2016년 08월 25일

ETTG00-16-01