

23389N1609
KGMF

양·한방·비타민 복합 감기약
제감코프 캡슐

일반의약품
분류번호: 114

010880638092005

제감코프캡슐은 양약과 한방의 복합 처방에 비타민B, C가 함유된 기침감기약으로 기침, 가래, 인후통 증상을 빠르게 완화시켜주는데 효과적이고 안전한 제품입니다.

[제품명] 제감코프캡슐

[성분·함량] 1캡슐 중

클로페라스티넨염산염(KP)	6.0 mg
α-메틸에페드린염산염(KP)	12.5 mg
노스카핀(KP)	4.0 mg
티아민질산염(KP)	4.0 mg
리보플라빈(KP)	2.0 mg
아스코르브산(KP)	15.46 mg
구아아를실폰산칼륨(USP)	41.0 mg
아세트아미노펜(KP)	100.0 mg
길경엑스산(3.7→1)(생규)	35.0 mg
첨가제(타르색소): 황색 203호, 적색 3호, 청색 1호, 황색 5호	

[성상] 미황색의 가루가 든 상부 암청색, 하부 미황색의 경질캡슐

[효능·효과] 감기의 제증상(여러증상)(인후통, 기침, 가래, 오한(출고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

[용법·용량] 1일 3회 식후 30분에 복용합니다.

만 15세 이상 : 1회 2캡슐

만 11세 이상~만 15세 미만 : 1회 1½캡슐

만 8세 이상~만 11세 미만 : 1회 1캡슐

[사용상의 주의사항]

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발 될 수 있습니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람.
- 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람.
- 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기).
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염용 경구제, 멀미약, 알레르기용약)
- 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 마십시오.
이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있습니다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 됩니다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염용 경구제, 멀미약, 알레르기용약)

4. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 마십시오.

이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있습니다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 됩니다.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(젖먹이, 갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일 수 있으므로) 의사와 상의하십시오.)
- 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영(젖먹이, 갓난아기) · 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영(젖먹이, 갓난아기) · 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.
- 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람.
- 다음과 같은 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람.

- 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람.
- 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람.
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부.
- 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 다음과 같은 기침이 있는 사람.
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열 · 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
- 이 약은 황색5호(산셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지하십시오.
1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역 · 구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 어지러움, 불안, 떨림, 불면
2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우
① 속(아나필락시): 복용 후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다.
② 피부점막만종후군(스티븐스-존슨중후군), 중독성표피괴사용해(리얼중후군): 고열을 동반하고, 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있습니다.
③ 천식
④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨) 등이 나타날 수 있습니다.
⑤ 간질성폐렴: 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타납니다.
3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지켜십시오.
2) 장기간 계속 복용하지 마십시오.
3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오.
4) 복용시에는 음주하지 마십시오.
5) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다.
- 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법 및 사용기간] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월


[포장단위] 12캡슐

[제품문의] (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

※ 구입 시 사용기한 또는 유효기간이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 첨부문서 작성일 이후에 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.sinilpharm.com) 또는 온라인의약도서관 (<http://drug.mids.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 이 제품은 안전용기 제품입니다. 아래의 그림과 같이 강하게 눌러 개봉해주시십시오.



코스닥상장
신일제약(주)
 충청북도 충주시 양성면 북상골길 28



설명서 작성년월일 : 2016.09.06