활성비타민 보강 –
고함량 비타민B 복합제

비맥스 B 엑티브정

B-max Active tab.

일반의약품
KGMP적격업체
분류번호 : 03190

KS-WEI 1위



8 806581 058902

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

유효성분 :

벤포티아민(활성비타민B1, KP)(티아민염산염으로서 36.2 mg)	50 mg
리보플라빈부티레이트(활성비타민B2, KP)	5 mg
리보플라빈(비타민B2, KP)	45 mg
피리독살포스페이트수화물(활성비타민B6, KP)	5 mg
피리독신염산염(비타민B6, KP)	45 mg
히드록소코발라민아세트산염(활성비타민B12, KP)	50 μg
니코틴산아미드(KP)	50 mg
판토텐산칼슘(KP)	50 mg
폴산(KP)	0,25 mg
제피아스코르브산(별규)(아스코르브산으로서 50 mg)	51,55 mg
토코페롤아세테이트2배산(KP)(비타민E로서 10 IU)	20 mg
콜레칼시페롤농축분말(EP)(비타민D로서 1000 IU)(동물유래성분 : 양, 양모)	10 mg
비오틴(USP)	50 μg
산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 60,3 mg)	100 mg
산화아연(KP)(아연으로서 30 mg)	37,4 mg
골린타르타르산염(USP)	50 mg
이노시톨(KP)	50 mg
우르소데옥시콜산(KP)	15 mg
γ-오리자놀(KP)	3 mg
셀레늄함유건조효모(KP)(셀레늄으로서 10,8 μg)	20 mg

첨가제 : 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이빨간색(200F650003), 전분글리콜산나트륨, 카르나우바납, 크로스카멜로오스나트륨, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스

【성 상】 적갈색의 타원형 필름코팅정제

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 B1, B2, B6, C, D, E의 보급
 – 육체피로 – 임신·수유기 – 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 – 발육기 – 노년기
 – 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 • 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 • 각기 • 눈의 피로 • 뼈, 이의 발육불량 • 구루병의 예방
2. 아연의 보급

【용법·용량】 만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 식후 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 1) 고칼슘혈증(hypercalciumia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 12개월 미만의 젖먹이 4) 신장(콩팥)결석 환자 5) 심한 증상의 신부전 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어른이 3) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태) 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다. 5) 소화성 궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자 6) 심장·순환기계기능 장애 환자 7) 신장(콩팥) 장애 환자 8) 저단백혈증 환자 9) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자 10) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자 11) 임부
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 위부(상복부)불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 변, 식욕부진, 복부(배부분)팽만감, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조갈증, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부분)통증, 저혈압, 폐부종(부기)
 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고니트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 9) 항말도스테론제, 트리암테렌과 병용[함께 복용(사용)] 투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
 10) 우발적으로 과량복용 한 경우 11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다. 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상 검사치에 영향을 줄 수 있다. 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
6. 저장상의 주의사항
 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 60정/병, 120정/상자(60정/병×2)

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 자세한 사항은 식품의약품안전처 의약품안전나라(https://nedrug.mfds.go.kr)를 참조하십시오.
- 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 작성일 : 2022년 07월 12일

【판매원】 (주)녹십자 / 충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 586 TEL.080-260-0033

【제조원】 (유)한풍제약 / 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 301 1~3층, 5층. 봉동로 705