

고함량 기능성 비타민

KGMP적격업체

일반 의약품

분류번호:316

비백작위정

B100Power Tab.

[성분 · 함량] 1정 중

콜린타르타르산염(DAB)-----	100.0mg
이노시톨(KP)-----	100.0mg
γ-오리자놀(KP)-----	10.0mg
벤포티아민(티아민염산염으로써 36.15mg)(KP)-----	50.0mg
리보플라빈(KP)-----	100.0mg
니코틴산아미드(KP)-----	100.0mg
폴산(KP)-----	0.1mg
판토텐산칼슘(KP)-----	108.7mg
피리독신염산염(KP)-----	100.0mg
d-비오틴(USP)-----	0.1mg
시아노코발라민(KP)-----	0.1mg
아스코르브산과립(아스코르브산으로써 100mg)(별규)-----	103.1mg
유비데카레논(KP)-----	5.0mg
산화아연(아연으로써 25mg)(KP)-----	31.12mg
유당수화물(기원:소, 사용부위:우유)	

[성 상] 갈색의 장방형 필름코팅정

[효능 · 효과]

○ 다음 경우의 비타민 B1, B2, B6, C의 보급

- 육체피로
- 임신 · 수유기
- 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
- 1) 비타민B1(벤포티아민)
 - 다음증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등)
 - 각기 • 눈의 피로
- 2) 비타민B2(리보플라빈), 비타민B6(피리독신염산염)
 - 다음증상의 완화: 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입 안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 아연의 보급

[용법 · 용량]

만 8세 이상 및 성인 : 1회 1정, 1일 1회 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 5) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
구역, 구토, 설사, 묽은 변, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
- 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 3) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각 신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 8) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것
- 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사시에 영향을 줄 수 있다.
- 5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법 및 사용기간] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

[학술정보문의] 080-585-0004

[포장단위] 60정, 120정

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
 ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
 ※ 설명서 개정일자 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
 ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
 ※ 제조자 : 알리코제약(주) / 충북 진천군 광혜원면 용소2길 21
 ※ 판매자 : 동화약품(주) / 서울특별시 중구 후암로 98, 19

개정년월일 : 2017.02.09

SI12265/M1