

고혈압 복합치료제

암로텔미정 40/5mg, 40/10mg, 80/5mg(텔미사르탄 파우더(23.9%),암로디핀베실산염)

- 【성분・함량】 1정 중
- 40/5mg：텔미사르탄파우더(23.9%)(텔미사르탄으로서 40mg)(별규) 167.36mg
 - 암로디핀베실산염(암로디핀으로서 5mg)(EP) 6.935mg
 - 40/10mg：텔미사르탄파우더(23.9%)(텔미사르탄으로서 40mg)(별규) 167.36mg
 - 암로디핀베실산염(암로디핀으로서 10mg)(EP) 13.87mg
 - 80/5mg：텔미사르탄파우더(23.9%)(텔미사르탄으로서 80mg)(별규) 334.72mg
 - 암로디핀베실산염(암로디핀으로서 5mg)(EP) 6.935mg
 - 첨가제(타르색소)：청색 1호 알루미늄레이크
 - 기타 첨가제：미질경셀룰로오스, 스테아르산아그네스, 옥수수전분, 전호화천분, 콜로이드성인산수화구, 푸미르산스테이릴나트륨, 흑색산화철, D-만니톨

- 【성 성】 현색과 연한 회색의 양면이 불룩한 타원형 이중정이다.
- 【효능・효과】 텔미사르탄 또는 암로디핀 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압

- 【용법・용량】 이 약의 권장용량은 1일 1회 1정으로, 식사와 관계없이 물과 함께 복용한다. 가능하면 매일 같은 시간(예：아침)에 복용하는 것이 권장된다. 이 약을 투여하기 전에 개개의 성분(텔미사르탄 또는 암로디핀)으로 용량을 조절할 것이 권장된다. 다음과 같이 개개의 성분에 대한 혈압이 조절되지 않는 경우 이 약으로 바로 전환하는 것을 고려할 수 있다.
-40/5밀리그램：암로디핀 5밀리그램 또는 텔미사르탄 40밀리그램으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에게 투여한다.
-80/5밀리그램：암로디핀 5밀리그램 또는 이 약 40/5밀리그램으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에게 투여한다.
-40/10밀리그램：암로디핀 10밀리그램으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에게 투여한다.
텔미사르탄과 암로디핀을 병용으로 복용하고 있는 환자인 경우, 복용의 편리함을 위하여 이 약(개개의 주성분 함량이 동일한 복합제)으로 전환할 수 있다 (이 약 40/5밀리그램에 해당).
○ 신장에 대한 주의：경증 및 중등도 신장애 환자인 경우 용량조절이 필요치 않으나, 중증의 신장애 환자 인 경우 낮은 용량으로 치료를 시작하는 것이 권장되며, 용량을 서서히 증량한다. 또한 혈청 크레아티닌 수치에 대한 주기적인 모니터링이 권장된다.
○ 간장애 환자：경증 또는 중등도의 간장애 환자에 대한 텔미사르탄의 1일 투여량은 40밀리그램을 초과하지 않아야 한다.
○ 고령자：75세 이상의 고령자인 경우, 암로디핀의 청소율이 감소되어 있으므로, 낮은 용량으로 치료를 시작하며, 용량을 서서히 증량한다.
○ 소아：만 18세 이하의 소아환자에 대한 안전성・유효성이 확립되어 있지 않아 이 약의 투여가 권장되지 않는다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고
이 약과 같이 레닌-안지오텐신계에 직접적으로 작용하는 약물을 일부에 투여하는 경우 저나라는 태아 또는 신생아에게 병적 상태 및 사망을 일으킬 수 있다. 특히 임신 27기 3개월 및 3기 3개월 중의 이러한 약물의 사용은 저혈압, 신생아 두개골 형성 저하증, 무호흡, 가역적 또는 비가역적인 신부전 및 사망을 포함한 태아 또는 신생아의 손상과 관련이 있다. 태아의 신기능의 저하가 원인일 것으로 추정되는 양수과다증이나 보고된 바 있으며, 양수과다증은 태아의 사지연속, 두개안면기형, 폐의 형성 저하증과 관련성이 있다. 미숙, 자궁내 성장 지연, 동맥관폐쇄증이 보고된 바 있으나, 이 약 노출에 의한 것인지 여부는 명확하지 않다. 임신이 진단된 경우에는 가능한 빨리 이 약의 투여를 중단해야 한다.
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것
1) 이 약의 주성분 또는 하이드로티라진 유도체에 과민증이 있는 환자
2) 임부(임신 27기 및 3기) 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
3) 수유부
4) 담도폐쇄성 질환자
5) 중증의 간장애 환자
6) 중증의 대동맥반칙성 환자
7) 소 환자
8) 이 약의 첨가제에 대해 불내성 등의 유전적인 문제가 있는 환자
9) 당뇨병이나 중등도~중증의 신장애 환자(사구체여과율<60ml/min/1.73m²)에서 알라스키렌 함유 제제와의 병용
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
1) 원발성 알도스테론증 환자：원발성 알도스테론증 환자의 경우, 일반적으로 레닌-안지오텐신계를 저해하는 혈압강화제는 효과가 없으므로 이 약의 사용은 권장되지 않는다.
2) 동맥관 또는 순모반칙성성 환자나 폐쇄성 비후성 심근병증 환자：다발 혈관질환과 마찬가지로 동맥관 또는 순모반칙성성 환자나 폐쇄성 비후성 심근병증 환자의 경우 주의하여야 한다.
3) 간장애 환자：암로디핀은 간에서 광범위하게 대사되며 텔미사르탄과 이 약의 대부분 성분으로 배설된다. 따라서 담즙 정제, 담도폐쇄성 질환에 있는 환자나 간장애 환자의 경우 간 청소율 감소를 예상할 수 있다. 따라서 경증 중등증의 간기능 장애 환자에게는 주의하여 투여해야 하며, 1일 1회 텔미사르탄 40밀리그램 초과하지 않아야 한다.
4) 혈중성 위 및 소신지장장애 등 위장관계 질환 환자：텔미사르탄 투여시 위장관계 질환 환자는 이 약의 투여시보다 더 자주 나타낸다. 위장관 출혈이 임상시험에서 드물게 관찰된 바 있으나 대부분 위장관 질환을 가진 환자에서 초기에 나타났다. 따라서 위장관계 질환환자에게 이 약을 투여할 때는 주의하여야 한다.
5) 신장애와 고혈압 환자：적응 양종의 신도파형측정이나, 하중 신장량 기능하는 경우의 신도파형측정이 있는 환자들 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 영향을 미치는 약물로 치료할 경우에도 신장애 환자에서 신장애의 위험이 증가된다. 양쪽 또는 한쪽의 신도파형측정음이 있는 환자에게 이 약을 투여할 경우 안지오텐신 전환효소(ACE) 저해제와 마찬가지로 혈청 크레아티닌 또는 혈청 요산질 수치의 상승이 예측된다.
6) 중증의 저혈압 환자
7) 투석을 해야 하는 신부전 환자
8) 고령자
9) 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)의 이중차단：안지오텐신 수용체 차단제(ARB), ACE억제제, 또는 알라스키렌 등 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)에 영향을 미치는 다른 약제와의 병용은 권장되지 않는다.

4. 이상반응
1) 텔미사르탄과 암로디핀 복합제
(i) 임상시험：텔미사르탄과 암로디핀의 병용투여는 1,200명 이상의 고혈압 환자들에서 그 안전성이 평가되었다. 이 환자들 중 320명은 6개월 이상 이들 약물에 노출되었으며 120명은 1년 이상 노출되었다. 이상반응은 전반적으로 경증으로 일시적으로 발생되었으며, 치료 중단이 필요한 경우는 드물었다.
위의 대조 요인 설계 임상 시험에서 2% 이상 발생한 이상반응으로, 위약군(n=46)에 비해 암로디핀/텔미사르탄 투여군(n=789)에서 더 높은 빈도로 발생한 이상반응은 다음과 같다.
표 1. 2% 이상 발생되었으며, 위약보다 발생률이 높은 이상반응

	암로디핀/텔미사르탄 병용투여군 (n=789)	위약군 (n=46)
말초부종	4.8%	0.0%
어지러움	3.0%	2.2%
기립성 저혈압*	6.3%	4.3%
오통	2.2%	0%

* 기립성 저혈압：이완기 혈압) 10 mmHg 감소 및/또는 수축기 혈압) 20 mmHg 감소
또한 이 약을 투여받은 환자에서 1% 이상 발생한 다른 이상반응으로는 어지러움 (2.0% vs 2.2%, 위약 대비) 및 두통(1.4% vs 4.3%, 위약 대비)이 있었다.

동 임상 시험에서 이 약을 투여받은 모든 치료 환자군의 2.2% 및 위약으로 투여받은 환자군의 4.3%에서 이상 반응으로 인해 임상 시험을 중단하였다. 이 약의 치료를 중단하게 된 가장 흔한 이유는 말초부종, 어지러움 및 저혈압 (각각 0.5% 이하)이었다.

(ii) 치료 후 조사 결과：국내에서 출시를 위하여 선 동안 610명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과, 임상사례의 발생률은 인과관계와 상관없이 3.28%(20/610명, 총 20건)로 보고되었다. 이 중 중대한 임상사례의 발생률은 0.49%(3/610명, 총 3건)로 간세포암증, 뇌경색, 울혈성심부전 각 0.16%(1/610명, 1건)로 보고되었다. 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응

은 0.16%(1/610명, 총 1건)로 울혈성심부전 0.16%(1/610명, 1건)가 보고되었다. 예상하지 못한 이상사례의 발생률은 인과관계와 상관없이 1.31%(8/610명, 총 8건)로 보고되었으며, 간세포암증, 근육골격통증, 뇌경색, 목통증, 비인두염, 상복부불쾌감, 상복부 통증, 체위 정어지럼증 각 0.16%(1/610명, 1건)로 조사되었다. 이 중, 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응 발생률은 0.33%(2/610명, 총 2건)로 상복부불쾌감, 체위정어지럼증 각 0.16%(1/610명, 1건)가 보고되었다.

- 2) 텔미사르탄
위약대조 임상시험에서 텔미사르탄을 투여한 환자에서 1% 이상 나타났으며 위약 투여환자보다 더 빈번하게 발현된 이상반응은 다음과 같다.
표 2. 1% 이상 발생되었으며, 위약보다 발생률이 높은 이상반응

	텔미사르탄 투여군 (n=1,455)	위약군 (n=380)
상기도 감염	7%	6%
오통	3%	1%
부비동염	3%	2%
설사	3%	2%
인후염	1%	0%

또한 텔미사르탄을 투여받은 환자에서 1% 이상 발현된 다른 이상반응 중 위약군과 유사한 빈도로 발생한 이상 반응은 인플루엔자 양 증후, 소화불량, 근육통, 요로감염, 복통, 두통, 어지러움, 통증, 두통, 기침, 고혈압, 흉통, 구역 및 말초부종이었다.

이외에도 추가적으로 보고된 이상반응 (0.3% 초과 발현)은 다음과 같다.

- 자율신경계：발기부전, 명반비 증가, 홍조
- 전신：알레르기, 발열, 다리 통증, 관절염
- 심혈관：두근거림, 의조성 부증, 협심증, 빠른 맥, 다리부종, 비정상적인 ECG
- 중추신경계：불면증, 졸린, 편두통, 감각이상, 감각이상, 불수의근 수축, 감각저하
- 위장관：부기, 변비, 위염, 구토, 구강건조, 지질, 위장염, 장염, 위식도 역류, 지통, 비특정 위장 관질환
- 대사성：통풍, 고콜레스테롤혈증, 당뇨
- 근골격계：관절염, 관절통, 다리 저림
- 정신계：불안, 우울, 신경과민
- 내상기계：감염, 전신감염, 농양, 종양이
- 호흡계：천식, 기관지염, 비염, 호흡곤란, 코출혈
- 피부：피부염, 발진, 습진, 가려움증
- 비뇨기계：잦은 배뇨, 방광염
- 혈관계：뇌혈관질환
- 특수 감각：시각 이상, 결막염, 귀울림, 귀의 통증

초기 임상시험 도중 혈관 부종이 1건 보고되었다.

- 위약 대조 임상시험에서 다음과 같은 실험실적 검사치 이상이 보고되었다.
- 헤모글로빈：2g/dL 이상 감소한 환자(가 텔미사르탄 투여에서 0.8%, 위약군에서 0.3% 보고되었다. 빈혈로 인한 투여를 중단한 환자는 없었다.
- 크레아티닌：0.5 mg/dL 이상 증가한 환자(가 텔미사르탄 투여군에서 0.4%, 위약군에서 0.3% 보고되었다. 텔미사르탄 투여군 중 1명의 피험자가 크레아티닌 및 혈청 요소질소(blood urea nitrogen, BUN)의 증가로 폐부종 보고의 위험이 있었다.
- 간효소：텔미사르탄 투여군 중 일부 환자에서 간수치 상승이 보고되었다. 현저한 수치 상승은 위약군에서 더 높은 빈도로 발생하였다. 텔미사르탄 투여 중 간기능 이상으로 인해 치료를 중단한 환자는 없었다.

추가적인 안전성 정보는 텔미사르탄 단일제 허가사항을 참조한다.

- 3) 암로디핀
가장 일반적으로 보고된 이상반응은 두통 및 부종이다. 용량의존적으로 보고된 이상반응 발생률은 다음과 같다.
표 3. 용량의존적으로 보고된 이상반응 발생률

이상반응	암로디핀 2.5mg (n=275)	암로디핀 5.0mg (n=236)	암로디핀 10.0mg (n=268)	위약 (n=520)
부종	1.8%	3.0%	10.8%	0.6%
어지러움	1.1%	3.4%	3.4%	1.5%
홍조	0.7%	1.4%	2.6%	0.0%
두근거림	0.7%	1.4%	4.5%	0.6%

또한 위약대조 임상시험에서 암로디핀을 투여받은 환자에서 1% 이상 발현된 다른 이상반응은 다음과 같다.

이상반응	암로디핀 투여군 (n=1,730)	위약군 (n=1,250)
두통	7.3%	7.8%
피로	4.5%	2.8%
구역	2.9%	1.9%
복통	1.6%	0.3%
출혈	1.4%	0.6%

이외에도 추가적으로 보고된 이상반응 (0.1% ~ 1% 발현)은 다음과 같다.

- 심혈관계：부정맥 (심실성 빈맥 및 심방세동 포함), 서맥, 흉통, 말초 허혈, 실신, 체위성 저혈 압, 혈관염
- 중추 및 말초 신경계：말초신경병증, 감각이상, 떨림, 현기증
- 위장관：식욕부진, 변비, 소화불량, 삼킴곤란, 설사, 방기, 헤장염, 구토, 진드기증
- 전신：알레르기 반응, 무력증, 오통, 작열감(hot flush), 관절감, 통증, 경직, 체중증가, 체중감소
- 근골격계：관절통, 관절증, 근육경련, 근육통
- 정신계：생기는 부전(남성 및 여성), 불면증, 신경과민, 우울, 비정상적인 골, 불안, 이인증
- 호흡기계：호흡곤란, 코출혈
- 피부 및 부속기관：혈관부종, 다형성 홍반, 가려움증, 발진, 홍반성 발진, 반구진성 발진
- 특수 감각：시각 이상, 결막염, 녹시, 안구 통증, 귀울림
- 비뇨기계：잦은 배뇨, 배뇨 장애, 빈뇨
- 자율신경계：구강 건조, 명반비 증가
- 대사 및 영양：고혈당, 갑종
- 혈액：혈액구 감소증, 자색반증, 혈소판 감소증

임상시험에서 암로디핀 투여와 연관된, 임상적으로 유의한 실험실적 검사 이상은 관찰되지 않았다. 암로디핀 투여 환자에서 0.1% 이하의 빈도로 보고된 다른 이상반응들은 다음과 같다.：심부전, 맥박 불규칙, 주기외 수축, 피부 발진, 가려움증, 피부 건조, 탈모, 피부염, 근육 약화, 단일 수축, 조화운동불능, 과다근육긴장증, 편두통, 남성비무, 무감동증, 초조, 기악상식, 위염, 식욕 증가, 붉은 변, 비염, 배뇨 장애, 다뇨증, 이상 후각, 시각 도처, 비정상적인 안구 조절, 눈비물증

추가적인 안전성 정보는 암로디핀 단일제 허가사항을 참조한다.

- 4) 시판 후 사용경험

텔미사르탄 또는 암로디핀의 시판 후 사용경험에서 보고된 이상반응은 다음과 같다.
- 텔미사르탄：가장 흔히 자발적으로 보고된 이상 반응은 두통, 어지럼증, 무력증, 기침, 구역, 피로, 식악, 부종, 인면 부종, 하지 부종, 혈관부종(지맹적 결과 수반), 가려움증, 과민반응, 발한 증가, 흉반, 흉통, 심방세동, 울혈성 심부전, 심근경색, 혈압 상승, 고혈압 악화, 저혈압(기립성 저혈압 포함), 고칼륨혈증, 저혈당(당뇨 환자에서), 실신, 소화불량, 설사, 통증, 요로 감염, 발기 부전, 오통, 복통, 구역 경련 (다리 경련 포함), 근육통, 서맥, 호산구증가증, 혈소판감소증, 요산 증가, 간기능 이상 및 간질환*, 급성 심부전을 포함하는 신장애, 빈혈, CPK 상승, 아니발릭사 반응, 일출 통증 (간염 및 간조영 포함)이었다. 텔미사르탄을 포함하는 안지오텐신 II 수용체 차단제를 투여 받고 있는 환자들에서 드물게 황문공해증이 보고된 바 있다.
* 텔미사르탄의 간기능 이상 및 간질환 시판 후 이상반응은 이러한 이상반응이 발현될 것으로 예상되는 일반 환자에서 대부분 발생하였다.

- 암로디핀：여성형 유방종양이 드물게 보고되었으며 약과의 인과관계는 불확실하다. 혈당 및 간효소 수치 상승 (대부분 췌장계 정제 또는 간염과 함께 나타남)이 암로디핀의 사용과 관련하여 보고 있었으며 몇몇 사례는 임금이 필요할 정도로 중증이었다. 차례외로 장폐, 백혈구 감소증, 혼란상태, 박리성 피부염, 스티븐스-존슨 증후군, 광과민 반응, 독성피부피사용해가 보고되었다.(빈도불명)

5. 일반적 주의

- 1) 임신：임신 기간 중에 안지오텐신 II 수용체 길항제 투여를 시작해서는 안 된다. 만약 안지오텐신 II 수용체 길항제의 지속적 치료가 필수적이지 않다면, 임신을 계획 중인 환자는 임부의 사용에 대해 안전성 프로파일의 확립된 다른 고혈압 치료제로 대체하여야 한다. 임신이 진단된 경우에는 가능한 빨리 안지오텐신 II 수용체 길항제의 치료를 중단해야 하며, 만약 적절하다면, 다른 치료제로 치료를 시작해야 한다.
- 2) 저혈압：체액이나 염류가 부족한 환자 (예, 고령자의 이뇨제로 치료 받고 있는 환자)와 같이 레닌-안지오텐신 시스템이 활성화된 환자들에서는 이 약의 치료를 시작한 후에 증후성 저혈압이 발생할 수 있다. 이러한 상태는 이 약을 투여하기 전에 교정하거나 면밀한 의학적 감독 하에 이 약의 용량을 감소하여 치료를 시작하여야 한다. 저혈압이 발생한 경우 환자를 반듯이 눕히고 필요하면 생리 식염수를 정맥주사로 정적 주입한다. 일시적인 저혈압 반응은 앞으로의 치료에 대한 금기 사항이 아니며, 일반적으로 일단 혈압이 안정화되면 어려움 없이 치료를 지속할 수 있다.
- 3) 고칼륨혈증：텔미사르탄의 경우 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 영향을 미치는 다른 약물로 치료중일 때 특히 신장애 환자 및/또는 심부전 환자의 경우, 고칼륨혈증이 일어날 수 있다. 위험이 있는 환자에 대해서 혈청 칼륨치의 적절한 모니터링이 권장된다. 레닌-안지오텐신계에 영향을 미치는 다른 약물의 사용경험을 바탕으로, 칼륨지류성 이뇨제, 칼륨보충제, 칼륨이 함유된 염 대용물 및 칼륨치를 상승시킬 수 있는 다른 약(제파린 등)과의 병용에 의해 혈청 칼륨치가 상승될 수 있으므로 이들 약물과 이 약의 병용투여는 신중해야 한다.
- 4) 신장애 환자：텔미사르탄의 경우 민감한 환자들에서는 레닌-안지오텐신-알도스테론 시스템 저해에 대한 결과로서 신기능의 변화가 예상될 수 있다. 신기능이 레닌-안지오텐신-알도스테론 시스템의 활성에 의존적일 수 있는 환자들(예, 중증의 울혈성 심부전 환자)에서는 안지오텐신-전환 효소(angiotensin-converting enzyme, ACE) 저해제 및 안지오텐신 II 수용체 길항제로의 치료가 수 변감소증 및/또는 진행성 질소혈증, 그리고 (드물게) 급성 심부전 및/또는 사망과 관련이 있었다. 유사한 결과가 텔미사르탄으로 치료를 받는 환자들에서도 나타날 수 있다. 신장애 환자에게 이 약을 투여할 때 혈청 칼륨 및 크레아티닌치의 주기적인 모니터링이 권장된다. 최근에 신장을 이식한 환자에 대해서는 이 약의 사용경험이 없다.
- 5) 심근경색 위험 또는 협심증의 증가：암로디핀의 경우 특히 중증의 폐색성 관상 동맥 질환이 있는 환자들에서 갑작스 채혈 차단제 사용 시작후나 용량을 증가시킨 시점에서 드물게 협심증 또는 급성 심근 경색의 발생 빈도, 기간 및 중증도가 증가한 기록이 있다. 이러한 영향에 대한 기전은 아직 해결되지 않았다.
- 6) 암로디핀의 경우 혈당농도 반감기가 길어 투여를 중지한 후에도 완전한 혈당안정화가 나타나므로, 투여 중지 후 다른 혈당강화제를 투여하는 경우에는 용량 및 투여간격에 주의하고 환자의 상태를 관찰하여야 한다.
7) 심부전환자에 대한 주의：허혈성 병인이 없는 NYHA III, IV등급의 심부전환자에 대한 암로디핀의 장기간, 위약대조시험(PRAISE-2)에서 암로디핀은 위약과 비교시 심부전의 약화율에 유의적인 차이가 없음에도 불구하고 폐부종 보고의 위험이 있었다.
- 8) 이 약은 소르비톨을 함유하고 있으므로 우전적으로 과당 불내성 환자에는 적합하지 않다.
- 9) 당뇨：심혈관 질환에 대한 추가적인 연구가 진행되고 있는 당뇨병자(예：당뇨와 관상동맥질환이 동시에 발병된 환자)인 경우, 안지오텐신 II 수용체 길항제 또는 안지오텐신 전환효소 저해제와 같은 혈압 강하제 복용 시 치명적인 심근경색 및 예상하지 못한 심혈관 질환으로 인한 사망 위험성이 증가할 수 있다. 당뇨 환자에게 관상동맥질환에 대한 증상이 나타나지 않고, 이에 대해 신장기능 평가가 없으므로, 당뇨 환자에 이 약 투여시 관상동맥질환을 발견하고 치료하기 위한 적절한 진단 방법(예：운동 부하 검사)을 우선적으로 실시해야 한다.
- 10) 운전 및 기계작업에 대한 영향：이 약이 운전 및 기계작업에 미치는 영향에 대한 연구는 실시되지 않았으나, 혈압강화제를 복용할 때 때때로 졸음, 어지러움이 나타날 수 있으므로 이약을 투여중인 환자는 약효가 운전 또는 위험의 조차지 수반되는 기계적 조작시 주의하여야 한다.
- 11) 기타：다른 혈압강화제(예로서, 허혈성 심질환이나 허혈성 심혈관 질환이 있는 환자에서 과도한 혈압 강하를 신장경색이나 뇌졸중을 일으킬 수 있다.

6. 상호작용

- 1) 암로디핀 및 텔미사르탄 병용시 유의한 약동학적 상호작용이 나타나지 않았다. 이 약과 다른 약물과의 약물 상호 작용에 대한 연구는 실시되지 않았다.
2) 텔미사르탄의 약물 상호 작용
① 디곡신：텔미사르탄과 디곡신과 함께 투여했을 때, 디곡신의 최고 혈장 농도 중앙값 (49%) 및 최저 농도 중앙값 (20%) 증가가 관찰되었다. 따라서 텔미사르탄 투여를 시작하거나, 투여량을 조절하거나 투여를 중단할 경우 나타날 수 있는 과다현 또는 과소한 나지탈리스 작용을 피하기 위해 디곡신 농도를 모니터링 하는 것이 권장된다.
② 리튬：리튬과 안지오텐신 전환 효소 저해제를 병용 투여하는 동안 혈청 리튬 농도의 가역적 증가 및 독성이 보고되었다. 텔미사르탄을 포함한 안지오텐신 II 수용체 길항제에 대해서도 이러한 사례들이 보고되었다. 따라서 리튬과 텔미사르탄을 병용하는 동안에는 혈청 리튬 수치를 모니터링하는 것이 권장된다.
③ 라미프릴 및 라미프릴라트：한 임상 시험에서 텔미사르탄과 라미프릴의 병용 투여는 라미프릴 및 라미프릴라트의 AUC0-24hr Cmax를 2.5배까지 증가시켰다. 이러한 관상 사혈에 대한 임상적 연관성은 알려지지 않았다.
④ 와르파린：텔미사르탄을 10일 동안 투여한 것은 와르파린의 평균 최저 혈장 농도를 약간 감소시켰다; 이러한 감소는 International Normalized Ratio (INR) 면에서 큰 변화를 유발하지는 않았다.
⑤ 비스테로이드 소염진통제(예, 항염증요제) 또는 아스피린, COX-2 저해제 및 비스테로이드 소염진통제에는 안지오텐신 II 수용체 길항제의 혈압강화효과를 감소시킬 수 있다. 신기능이 손상된 일부 환자(예：발수환자, 신기능이 손상된 노인 환자)에서 안지오텐신 II 수용체 길항제와 COX 저해제 병용투여시 급성신부전(일반적으로 가역적임)을 포함한 신기능 손상 악화가 보고되었다. 따라서 주의하여 병용투여하며, 특히 노인 환자의 경우 더 많은 주의를 기울여야 한다. 비스테로이드 소염진통제와 이 약을 병용 투여받는 환자들에게는 충분한 수분을 공급해 주어 아하여 병용치로 시작 후 추가적으로 신기능을 모니터링 해야 한다.
⑥ 기타 약물：텔미사르탄을 아세트아미노펜, 암로디핀, 글리벤클리리드, 심바스타틴, 히드로클로로타이드 및 이부프로펜과 병용투여하였을 때 임상적으로 유의한 상호 작용은 없었다. 텔미사르탄은 사이토크롬 P450 시스템에 의해 대사되지 않으므로 생체외에서 CYP2C19을 약간 저해하는 것을 제외하고는 사이토크롬 P450에 대해 영향을 미치지 않는다. 텔미사르탄은 사이토크롬 P450 효소를 저해하는 약물과 상호작용할 것으로 예상되지 않는다. CYP2C19에 의해 대사되는 약물의 대사를 저해할 가능성을 제외하고, 텔미사르탄은 사이토크롬 P450에 의해 대사되는 약물들과 상호작용할 것으로 예상되지 않는다.

- ⑦ 추가적인 약물상호작용 정보는 텔미사르탄 단일제 허가사항을 참조한다.
⑧ 안지오텐신 수용체 차단제(ARB), ACE억제제 또는 알라스키렌의 병용투여에 의한 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)의 이중차단은 이러한 약물의 단독요법과 비교시 저혈압, 실신, 고칼륨혈증 및 신기능의 변화(급성 심부전 포함) 위험을 증가시키는 것과 관련이 있다. 이 약과 RAAS 에 작용하는 다른 약물을 병용투여하는 환자의 경우, 혈압, 신기능 및 전해질을 면밀히 모니터링 해야 한다. 당뇨병이나 중등증~중증의 신장애 환자(사구체여과율 (60 mL/min/1.73m²)에게 이 약과 알라스키렌 함유제제를 병용투여하지 않는다.
3) 암로디핀의 약물 상호 작용
① 임상 시험에서 암로디핀은 티아지드계 이뇨제, 베타-차단제, 안지오텐신-전환 효소 저해제, 지속형 질산염류, 니트로글리세린, 살해정, 디곡신, 와르파린, 비스테로이드소염성제, 항생제 및 경구용 당뇨병 제제 등과 안전하게 병용되었다.
② 자용 주사：암로디핀은 자용이나 자용주사와 병용시 일부 환자에서 생체이용률 증가로 인한 혈압강화효과와 증가가 나타날 수 있으므로, 병용투여를 권장하지 않는다.
③ 시메티딘, 실데나필：암로디핀의 약동학에 대한 유의한 영향은 없었다.
④ 아도르바스타틴, 디곡신, 와르파린：암로디핀에 의한 약동학적 및 약력학적 유의한 영향은 없었다.
⑤ 심바스타틴：여러 용량의 암로디핀과 심바스타틴 80 mg를 병용투여한 결과 심바스타틴을 단독으로 투여하였을 때보다 심바스타틴에 대한 노출이 77%까지 증가하였다. 따라서 암로디핀을 복용하고 있는 환자에서는 심바스타틴 복용량을 1일 최대 20 mg으로 제한한다.
⑥ 타크로리무스：암로디핀은 타크로리무스의 전신 노출을 증가시킬 수 있다. 따라서 타크로리무스의 혈장농도를 자주 모니터링하고 필요시 용량조절이 권장된다.
⑦ 시클로스포린：신장기능 환자를 대상으로 시클로스포린과 이 약을 병용투여한 여러 연구에서, 이 약과 병용투여 시 시클로스포린의 최저혈장농도는 변화가 없거나 40%까지 증가하는 것으로 보고되었다.
⑧ CYP3A4 유도제：CYP3A4 유도제(예, 리팜피신, 세틴트 존스 워트(hypericum perforatum))와의 병용투여는 암로디핀의 혈장농도를 변화시킬 수 있다. 그러므로 특히 강력한 CYP3A4 유도제와 병용투여하는 기간 및 그 이후에 혈압을 모니터링하고 용량 조절을 고려해야 한다.

- ⑨ 추가적인 약물상호작용 정보는 암로디핀 단일제 허가사항을 참조한다.

7. 임부 및 수유부에 대한 주의

- 1) 임부：텔미사르탄과 같은 안지오텐신 II 수용체 길항제의 사용은 임신 17기 3개월 동안은 권장되지 않으며, 27기 및 37기 3개월 동안은 금지된다. 이 약을 임신중인 여성에 투여한 적절한 자료는 없다.

비임상자료에서 기형 발생은 나타나지 않았으나 태자독성은 나타났다. 임신 27기 및 37기 3개월 동안, 안지오텐신 II 수용체 길항제의 노출은 인제 태자독성 (신장기능 감소, 양수감소증, 두개골 골화 지연)과 신생아독성(신부전, 저혈압, 고칼륨혈증)을 유발한다.

임신 기간 중에 안지오텐신 II 수용체 길항제 투여를 시작해서는 안 된다. 만약 안지오텐신 II 수용체 길항제의 지속적 치료가 필수적이지 않다면, 임신을 계획중인 환자는 임부의 사용에 대해 안전성 프로파일의 확립된 다른 고혈압 치료제로 대체하여야 한다. 임신이 진단된 경우에는 가능한 빨리 안지오텐신 II 수용체 길항제의 치료를 중단해야 하며, 만약 적절하다면, 다른 치료제로 치료를 시작해야 한다. 만약 임신 27기 3개월 이후로 안지오텐신 II 수용체 길항제에 노출된 경우, 신장 기능과 두개골 초음파 검사가 권장된다.

안지오텐신 II 수용체 길항제를 복용했던 임부의 영아는 반드시 저혈압, 빈뇨, 고칼륨혈증 등의 발현 가능성을 긴밀하게 관찰하여야 한다.

- 2) 수유부：이 약이 사람의 모유 중으로 이행되는지의 여부가 알려져 있지 않으나 동물시험에서는 텔미사르탄이 유즙으로 분비되는 것이 확인되었다. 그러므로 수유하는 동안에는 이 약을 투여하지 않아야한다.
3) 생식능：사람에서 이 약 및 개별 주성분의 생식능은 연구된 바 없다. 텔미사르탄 및 암로디핀의 병용투여한 별도의 생식독성시험은 실시되지 않았다. 비임상시험에서 암컷 및 수컷의 수태능에 대한 텔미사르탄의 영향은 관찰되지 않았으며, 유사하게 암로디핀의 영향도 보고된 바 없다.
8. 소아에 대한 주의：이 약은 18세 이하 소아환자에게의 안전성 및 유효성에 대한 자료가 충분치 않으므로, 투여가 권장되지 않는다.
9. 고령자에 대한 주의：이 약을 고령자에서 투여시 용량 조정이 필요하지 않으나, 일부 고령자에서 보다 민감한 반응이 나타날 수 있음을 배제할 수 있으므로 주의하여 투여한다. 75세 이상의 고령자인 경우, 암로디핀의 청소율이 감소되어 있으므로, 낮은 용량으로 치료를 시작하며, 용량을 서서히 증량한다.

10. 과량투여시의 처리

- 1) 텔미사르탄：사람에서의 과량투여에 대한 유용한 정보는 제한적이다. 텔미사르탄 과량투여시 가장 현저한 증상으로 저혈압, 빈맥(백교간신경 자극으로 인한), 서맥, 어지러움 및 급성심부전 등이 보고되었다. 저혈압 증후가 나타나면 보조적인 치료를 실시해야 한다. 텔미사르탄은 혈액투석에 의해 제거되지 않는다. 환자를 주의감에 관찰해야 하고 복용 후 경과시간 및 증상의 경중에 따라 대증치료를 실시한다. 구토와/또는 위세척을 고려할 수도 있다. 약용탄이 처치에 유용할 수도 있다. 혈청 전해질 수치와 크레아티닌 수치를 자주 모니터링 해야 한다. 저혈압이 나타나면 환자를 눕히고 염분과 체액 대용제를 빨리 공급해야 한다.
2) 암로디핀：심한 과량투여 시 과도한 말초혈관확장과 함께 반사성 빈맥도 나타날 수 있다는 것이 현제까지의 자료에서 언급되었다. 또한, 전신성 저혈압의 증세에 심하고 오랫동안 지속되어 속상 태에 이르게 되거나 속이 일어나는 치명적인 결과가 초래되었다고 보고되었다. 건강한 자원자에서 암로디핀 10 mg를 투여한 즉시 혹은 2시간 후까지 약용탄(medical carbon)을 투여하였을 때 암로디핀의 흡수가 유의하게 감소되었다. 일부 경우에는 위세척이 유용할 수 있다. 암로디핀의 과량투여로 인한 임상적으로 심각한 저혈압은 심장과 호흡기능을 자주 모니터링 하고, 사지의 위자를 몸체보다 높게 유지하여 혈액등과 같은 순환체액 및 노폐물량을 충분히 확보하는 등의 적극적인 심혈관계에 대한 보조요법을 필요로 한다. 혈관수축제 사용을 금기하는 특별한 경우가 아니라면, 혈관긴장력 및 혈압을 회복하는 데 혈관수축제가 유용할 수 있다. 갑작스체질저해제의 효과를 반전시키는데 갑칼슘글루콘산염의 정맥투여가 유용할 수 있다. 암로디핀은 단백질결합율이 매우 높으므로 혈액투석은 도움이 되지 않는다.

11. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 다른 용기에 바꾸어 넣은 것은 사료인물이 되거나 물질 유출이면서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

12. 의약품동등성시험 정보 ^{*)}

- 1) 시험약 트윈엑트정80/5밀리그램(주다산제약)과 대조약 트윈스타정80/5밀리그램(한국베링거인겔하임㈜)을 2×2 교차시험으로 각 1명씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구투여하여 57명의 혈중 텔미사르탄 및 암로디핀을 측정한 결과, 비교평가항목치(AUC_{0-∞}, C_{max})를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 차의 90% 신뢰구간이 log 0.8에서 log 1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0~72hr} (ng · hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	트윈스타정80/5밀리그램 (한국베링거인겔하임(주))	3591±2303	711.4±447.7	1.00 (0.50 ~ 4.00)	20.46±16.72
시험약	트윈엑트정80/5밀리그램 (주다산제약)	3838±2298	721.1±447.8	1.00 (0.50 ~ 4.00)	19.81±10.48
90% 신뢰구간 * (기준 : log 0.8 ~ log 1.25)					
		log1.0036 ~ 1.1541	log0.8559 ~ 1.1685	-	-
(AUC _{0~72hr} , C _{max} , t _{1/2} : 평균값±표준편차, T _{max} : 중앙값(범위), n=57)					
AUC _{0~72hr} : 투약시간부터 최종혈중농도 측정시간 까지의 혈중농도-시간곡선면적 C _{max} : 최고혈중농도 T _{max} : 최고혈중농도 도달시간 t _{1/2} : 말단 소실 반감기 * 비교평가항목들을 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간					