

탈모의 보조치료

케라티모 캡슐

Keratimo caps.

[제품명] 케라티모캡슐

[원료약품 및 분량] 1캡슐(394.0mg) 중

■ 유효성분 : 악용호모(발규).....	100.0 mg
케라틴(발규).....	20.0 mg
(총 아미노산으로서 히스티딘1.22mg, 로아신4.91mg, 리신4.1mg)	
티아민질산염(KP).....	60.0 mg
판토텐산칼슘(KP).....	60.0 mg
L-시스틴(KP).....	20.0 mg
p-아미노벤조산(BP).....	20.0 mg

■ 첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호, 청색1호, 적색40호

■ 기타첨가제 : 크로스포비돈, 스테아르산마그네슘, 글로이드성아산화규소, 캡슐

[성상] 연하색 가루의 내용물이 든 상부 녹색, 하부 미황색의 경질캡슐제

[효능·효과]

1. 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육 부진
2. 탈모의 보조치료

[용법·용량]

성인 : 1회 1캡슐을 1일 3회 식후에 복용한다.

12세 이상 소아 : 1회 1캡슐을 1일 1~2회 식후에 복용한다.

12세 미만은 복용하지 않는다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 사람
- 2) 12세 미만 소아

2. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 2) 이 약은 황색5호(설페틸로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분은 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 위통, 구도 등 위장관 불쾌감과 발한, 빈맥, 가려움, 두드러기, 두통, 어지럼, 혼조
- 2) 두부 이외의 신체부위에서 발모현상이 나타는 경우
- 3) 진행진 용법·용량대로 3~4개월 사용 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우
- 4) 증상이 지속되거나 기대하는 효과가 나타나지 않는 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 설페티아미드 제제와 동시 복용 시 주의할 것.
- 2) 흥토로 인한 탈모나 안드로젠 유전성 탈모증, 남성형 대머리에는 사용하지 말 것.

3) 이 약은 당뇨병환자에 복용할 수도 있다.

4) 평균 치료 기간은 3~6개월이다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 사용기한이 초과된 것은 복용하지 말 것.
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품들 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법] 차광기밀용기, 25℃이하 보관.

[사용기간] 제조일로부터36개월

[포장단위] 90캡슐(10캡슐PTx9), 180캡슐(90캡슐상자x2)

[취급상의 주의사항]

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과하였거나 유통과정 중 변질변태 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입하신 업체를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 본 의약품들 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어와 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
- ※ 부작용피해구제신청 : 한국의약품안전관리원(☎1644-6223)
- ※ 최종수정일자(2021년00월00일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)의 “의약품 검색” 또는 12세(☎02-574-2541)에서 확인할 수 있습니다.

[제조자] 정우신약(주) / 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 60



정우신약(주)