

생약성분의 혈액순환 개선제

# 징코메디

은행염 건조엑스 정

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어보시고,  
사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

## [원료약품의 분량] 1 정 중

유효성분 : 은행염건조엑스 (생구) ..... 120.0 mg  
첨가제 (타르색소) : 청색1호일루미눔레이크, 황색203호일루미눔레이크  
첨가제 (동물유래성분) : 유당수화물 (소, 우유)  
기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 녹색 (85G41016),  
크로스카르멜로오스나트륨, 탈크

## [성상]

녹색의 정방형 필름코팅정제

## [효능·효과]

### 1. 주효능 효과

- 1) 말초동맥 순환장애(간헐성 파행증(이따금 절뚝거림))의 치료
- 2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
- 3) 이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

## [용법·용량]

### 성인

- 1) 말초동맥순환장애, 어지러움, 이명(귀울림): 은행염건조엑스로서 1회 40밀리그램 1일 3회 또는 1회 80밀리그램, 1일 2회 경구투여합니다. (먹습니다. 복용합니다.)
  - 2) 기질성 뇌기능장애: 은행염건조엑스로서 1회 40~80밀리그램 1일 3회 또는 1회 120밀리그램 1일 2회 경구투여합니다. (먹습니다. 복용합니다.)
- 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감합니다.

## [사용상의 주의사항]

### 1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

### 2. 부작용

- 1) 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있습니다.
- 2) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났습니다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다.
  - 어지러움
  - 가려움증

### 3. 일반적 주의

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않습니다

### 4. 임부에 대한 투여

동물실험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적습니다.

### 5. 소아에 대한 투여

소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않습니다.

### 6. 저장상의 주의사항

직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아) 보관합니다.

## [저장방법] 기밀용기, 실온보관 (1~30℃)

## [포장단위] 120 정, 240 정

※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상받을 수 있습니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지나거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서의 작성일자 (2019년 2월 26일)이후 변경된 내용은 홈페이지([www.greencross.com](http://www.greencross.com)) 나 소비자 상담실 (080-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.

제조의처 및 판매처



충북 홍성군 금강읍 무곡로66번길 26 TEL. 031-280-4300  
소비자 상담실 TEL. 080-260-0033

제조사



경기도 화성시 향남읍 제막로123길 87