

“항산화성분 + 비타민D”

큐엔디 1000

QnD 1000 soft cap. 연질캡슐

일반 의약품

분류번호:03190

KGMP적격업체

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(360 mg) 중

유비데카레논(KP) 10 mg

토코페롤아세테이트(KP) 10 mg

(비타민E로서 10 IU)

농축콜레칼시페롤(유상)(BP) 1 mg

(비타민D로서 1,000IU)

착색제(천연색소) : 안나토색소

[성 상] 주황색의 유상 내용물을 함유한 주황색의 타원형 연질캡슐

[용법·용량] 만 12세 이상 및 성인 1일 1회, 1회 1캡슐 복용

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 D, E의 보급

- 임신·수유기, 발육기, 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방

[사용상의 주의사항]

1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

(1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재 하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자

(2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

(3) 만 3개월 미만의 젖먹이

(4) 신장결석 환자

2) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

(1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

(2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.

(3) 신장결석 병력이 있는 환자

3) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적

(2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다

(3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다

(4) 우발적으로 과량복용 한 경우

(5) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4) 기타 이 약의 복용 시 주의사항

(1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

5) 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

(2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐 하여) 보관할 것.

(3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[포장단위] 60연질캡슐 [저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

[소비자 상담실(반품 및 교환처)] 02-847-7733

[판매원]  동학약품

서울특별시 중구 후암로 98, 19층

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[제조원]  코스맥스파마(주)

충청북도 제천시 바이오밸리3로 30

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용 기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여드립니다.

※ 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 설명서 작성일자(2016년 11월)이후 변경된 내용은 온라인의약 도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

작성일 : 2016년 11월