

헤토마신 (구공해독당) 캡슐

일반의약품 / 분류번호 : 132

【제품명】 헤토마신캡슐(구공해독당)

【원료약품 및 분량】 1캡슐(636.0mg) 중

방풍(KP)	500.0mg
우방자(KP)	500.0mg
연교(KP)	835.0mg
형개(KP)	250.0mg
강활(KP)	250.0mg
감초(KP)	250.0mg
갈경(KP)	500.0mg
석고(생규)	1665.0mg
구공해독당건조엑스로서	522.5mg

동물유래성분 : 유당수화물(KP)/소/우유 첨가제(타르색소) : 적색 4호, 청색 1호, 황색 5호, 황색 4호

【성상】 갈색의 분말이 충전된 상 담갈색 · 하 미황색 불투명 캡슐체

【효능 · 효과】 인후(목구멍)가 부어 아픈 다음 증상 : 편도염, 편도주위염

【용법 · 용량】 보통 성인 1회 2캡슐, 1회 7-14세 성인 용량의 2/3(4/3캡슐), 4-6세 성인 용량의 1/2(1캡슐), 2-3세 성인 용량의 1/3(2/3캡슐), 1세 이하 성인용량의 1/4(1/2캡슐)를 1일 3회 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 미지근한 물에 녹여서 입이나 목 등을 적서가면서 소량씩 천천히 복용한다(캡슐로 삼키지 말 것.).

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
2) 이 약은 황색5호(산셀로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

1) 고혈압 환자
2) 심장병(심장장애) 또는 신장병(신장장애) 환자
3) 부종(부기) 환자
4) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
5) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
7) 몸이 허약한 환자(체력이 쇠약해진 환자, 몸이 약한 환자)(이상반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다.)
8) 위장이 허약하고 설사하기 쉬운 환자(식욕부진, 위부(상복부)불쾌감, 묽은 변, 설사 등이 나타날 수 있다.)
9) 지금까지 의사에 의해 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
10) 1세 이하의 영아(젖먹이, 갓난아기)(의사의 진료를 받는 것을 우선으로 하며, 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 말 것.)

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
(1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등 (1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 살임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인 되는 경우 복용을 중지할 것.)
(2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.

(3) 피부 : 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등
(4) 소화기계 : 식욕부진, 위부(상복부)불쾌감, 묽은 변, 설사 등
2) 5-6회 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
2) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
3) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 무르게 이노제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 타이디드계 이노제 (트리클로르메타이디드)와 병용(함께 복용(사용))시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
4) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 성약의 중복에 주의할 것.
5) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 복용시킬 것.

7. 저장상의 주의사항

1) 적사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것 (사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).
2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30 °C)

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 자사모장단위

【소비자상담실】 02-574-2541

【제조자】 정우신약(주) 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 60

본 의약품은 KGMP직접업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 보상받을 수 있습니다.

최종승정일자(2016년 10월 25일) 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.



정우신약주식회사

충남 아산시 신창면 서부남로 790번길 60



1610-01