

항산화제 함유
근육경련 및 혈액순환개선제

일반의약품
60캡슐

일양약품

plus

투와이스 플러스

어깨 · 목결림 · 수족저림 · 냉증

마그네슘결핍으로 인한 근육경련

신경통, 근육통, 관절통

눈의피로 : 눈꺼풀 떨림

말초혈행장애



1개월분 아침·저녁 1캡슐

[원료약품 및 분량] 1캡슐 중

산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 150.78 mg)	250 mg
토크페롤아세테이트(KP)(비타민E로서 500 IU)	500 mg
벤포티아민(KP)(티아민염산염으로 14.46 mg)	20 mg
티아민질산염(KP)	35 mg
셀레늄함유건조효모(KP)(셀레늄으로서 20 µg)	37 mg
감마오리자놀(KP)	10 mg
첨가제(타르색소) : 적색3호, 적색4호, 청색1호	
첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(소, 가축)	

[성상] 미황색의 유상 내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐

[효능 · 효과]

○ 비타민 E 및 B1의 보급

- 육체피로 - 임신 · 수유기 - 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 - 노년기

○ 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.

- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨 · 목결림, 수족저림 · 수족냉증(손발이 차가움) - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등) - 각기 - 눈의 피로

○ 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

[용법 · 용량] 만 12세 이상 및 성인 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

[저장방법/사용기간] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 24개월

[소비자상담실] 080-010-1114

제조번호 : TP 701

사용기한 : 2019. 01. 30



항산화제 함유
근육경련 및 혈액순환개선제

일반의약품
60캡슐

일양약품

plus

투와이스 플러스

어깨 · 목결림 · 수족저림 · 냉증

마그네슘결핍으로 인한 근육경련

신경통, 근육통, 관절통

눈의피로 : 눈꺼풀 떨림

말초혈행장애



1개월분 아침·저녁 1캡슐

[사용상의 주의사항]

1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 (2) 만 12개월 미만의 젖먹이 (3) 심한 증상의 신부전 환자 2) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. (1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계제제, 제산제 3) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 (3) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자 (4) 심장 · 순환기계기능 장애 환자 (5) 신장장애 환자 (6) 저단백혈증 환자 (7) 임부 4) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의 할 것. 상단 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은 변, 설사, 붉은 반점, 부전수축심장 박동정지, 중추신경계 기능저하, 피부염, 딸 · 호흡시 악취, 탈모, 조급증 (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. (3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다. (4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. (5) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. (6) 우발적으로 과량복용한 경우 (7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 5) 기타 이 약의 복용 시 주의사항 (1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것. (2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것. (3) 저장상의 주의사항 (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.



[제조자] 동방에프티엘(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 78

[판매원] 일양약품(주) 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110