

고함량 기능성 활성비타민

# 오늘비타

더블골드정 Double Gold



8 806265 009114

일반의약품

[제품명] 오늘비타더블골드정

[유효성분] 이 약 1정 (563mg) 중  
푸로스티아민 (활성비타민B<sub>1</sub>) (KP) -----100mg  
리보플라빈부티레이트 (활성비타민B<sub>2</sub>) (KP) -----5mg  
피리독살 포스페이트수화물 (활성비타민B<sub>6</sub>) (KP) -----5mg  
히드록소코발라민아세트산염 (활성비타민B<sub>12</sub>) (KP) -----10.44μg  
우르소데옥시콜산 (UDCA) (KP) -----30mg

[참가제(타르색소)] 적색4호, 황색4호, 황색203호

[기타 참가제] 경질무수규산, 경화식물유, 알도덱스트린, 무수인산수소칼슘, 스테아르산나트륨, 오파드라이틴색(03B28796),  
오파드라이200주황색(200F630035), 오파드라이옐론색(62W28547), 코포비돈, 크로스포비돈

[성상] 주황색의 타원형 필름코팅 정제

[효능 효과] • 다음 경우의 비타민B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>6</sub>의 보급:

- 육체피로, 임신·수유기, 병중 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)
- 각기
- 눈의 피로

[용법 용량] 만 8세 이상의 어린이 및 성인 · 1일 1회 1정씩 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 3개월 미만의 영아

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 만 1세 미만의 영아
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이  
첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우  
구역, 구토, 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부(배부분) 팽만감
- 2) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy):  
말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 3) 흡산(염산)이 부족한 환자에게 비타민B<sub>12</sub>를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 4) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 5) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 용량을 지키십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오.
- 3) 요를 황색으로 변화시켜 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 3) 오염(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

[포장단위] 60정/병, 120정(60정/병X2)

[최신정보확인방법] 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지([www.dapharm.com](http://www.dapharm.com))에서 확인 할 수 있습니다.

• 이 약을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

• 구입시 사용기한이 경과되었거나 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.

[문의전화] 080-920-2002(고객만족팀)

[작성 연월일] 2019.02.20 [부작용 보고 및 피해구제 신청] 1644-6223 (한국의약품안전관리원)

제조의회사

**DA** 동아제약

본사: 서울특별시 동대문구 전호대로 64

공장: 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 200-23(1,2A,4A층)

제조자

**DA** 동아제약

강성북도 강선시 진랑읍 공단6로24길 18

ONVTD120-90001

