


※ 제품의 안정성을 위해 반드시 복용시 지켜야 할 사항을 유지하여 주십시오.



● 열선, 수유기, 성질개변은 체내 혈액 요구량이 증가하여 혈분이 부족하게 되므로 혈분이 나타내지 않습니다. 바미센스점은 위장관 벽에서 피부와 신장으로 흡수되는 비어온 혈액의 3%를 사용하여 혈분 부족을 해소하며 나타낼 수 있는 위장장벽의 부족함을 개선하였습니다. 혈액순환개선, 구성성분인 혈분 분산효과와 기혈이 매끄러워 혈액순환에 필수적인 콜린(인산), 적혈구의 생성 및 재생 등의 조절작용에 필요한 시아노코발라민, 구루 및 철분이 골상 흡수에 도움이 되는 피라독시나민을 함유하며 피라독시나민과 에너지 대사에 중요한 역할을 하는 판토텐산칼슘을 추가로 보강하였습니다. 또한, 적은 시아즈의 약화작용으로 복 넘임이 쉽고 궤물표면적으로써 혈분 부족을 빠르게 보충할 수 있으며 유해산소인 과산화수소와 과산화물 제거하지 않은 안전함 및 알러지 반응의 예방 및 치료제입니다.

Prod. Am J (Chicago Company, 703) May 1993

【제품명】 바미센스점

【성분·함량】 (1정중)

폴리비타민 B12 복합제(1정당 35mg)	125.0mg
아미노산 복합제(1정당 100mg)	12.0mg
아미노산 복합제(1정당 100mg)	12.0mg
아미노산 복합제(1정당 100mg)	12.0mg
아미노산 복합제(1정당 100mg)	12.0mg
아미노산 복합제(1정당 100mg)	12.0mg

【성상】 갈색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

- 열 결핍성 빈혈의 예방 및 치료
- 다음경우의 비만 및 과체중
 - 임신·수유기
 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후의 체중저하)

【용법·용량】 만 8세 이상 어린이 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정씩 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

혈 항응고제 또는 다른 약제와 어린이가 시고로 2명씩 복용하였을 경우 응고력 저하를 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12살 미만 어린이의 환자
- 3) 혈액순환(혈액) 이상으로 철이 결핍, 혈액(혈액)에 철 결핍, 혈액(혈액)에 철 결핍, 혈액(혈액)에 철 결핍

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 구루 등 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 만 1세 미만의 영아
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 소화장애, 만성폐렴, 만성신장질환, 만성신장질환 등의 위장질환 환자
- 4) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 5) 신장장애 환자
- 6) 저산소혈증 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. (상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.)

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - ① 철분결핍: 두드러기, 가려움, 피부과민증, 복부(배)부종, 위통증, 경련, 구토, 설사, 열, 혼수
 - ② 피로감: 1일 500 mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 심각한 경련 또는 신경병적 증후군(neuropathy) : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화에 나타날 수 있습니다.
 - ③ 흡수: 부족한 환자에게 비만(BMI)을 1일 10mg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
 - ④ 약물투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고혈압, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - ⑤ 항암제(시스플라틴, 트라스테주마비)와 병행하여 복용할 경우 구갈(구토)을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - ⑥ 우발적으로 과량복용 한 경우
 - ⑦ 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 장기간 복용: 용량을 잘 지켜주세요.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 투여하십시오.
- 3) 녹차, 홍차, 우유 등을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피하십시오.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 밀 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 3) 우발적으로 복용을 먹고 물질을 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지마십시오.


【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 실온(1~30°C)에서, 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30정 (10정/717포장×3), 120정 (60정/2717포장×2)

【개봉방법】 바미센스점은 유,소아 보호를 위한 안전장벽 제품입니다.

※ 아래 그림과 같이 포장을 개봉해 주세요.

PTP포장)



위 그림처럼 밀집 이상의 힘으로 강하게 눌러서 개봉하십시오.

병 포장)



① 병뚜껑을 위에서 아래로 힘껏 누릅니다.
② 뚜껑을 누른 상태에서 돌립니다.

※ 기타 주의

1. 허가된 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
2. 사용기간이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 복용을 금하지 마십시오.
- ※ 만약 구입시 시공기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공청(제약위원회) 고시 '소비자 보호해결기준'에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
- ※ 약품의 용어 설명 및 기타 자세한 약품 정보는 식품의약품안전처 인터넷의약품(www.mfds.go.kr)을 참조하십시오.
- ※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223)

【제품문의】 0212211-6700, www.sinilpharm.com

본사 : 서울특별시 동대문구 사가정로 272

공장 : 충청북도 충주시 양성면 복성길 28

코스닥상장
신일제약(주)
충청북도 충주시 양성면 복성길 28

설립자 작성년월일 : 2016.11.18

