

벤포티아민·γ-오리자놀을 함유한
근육경련 및 말초혈행장애 개선제

마그토벤

연질캡슐



일반의약품
분류번호: 03190
KGMPP적격업체

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

토코페롤아세테이트(KP)	500.0mg
(비타민E로서 500IU)	
산화마그네슘(KP)	250.0mg
(마그네슘으로서 150.78mg)	
피리독신염산염(USP)	50.0mg
티아민질산염(KP)	28.0mg
벤포티아민(KP)	22.0mg
(티아민염산염으로서 15.91mg)	
감마오리자놀(KP)	10.0mg
첨가제(타르색소) : 적색4호, 황색5호, 청색1호	
첨가제(동물유래) : 숙신산젤라틴(기원동물 : 돼지, 사용부위 : 가죽)	

【성상】 회백색의 유상 내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 E, B1, B6 의 보급
 - 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 각기, 눈의피로
 - 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

【용법·용량】 만 12세 이상 및 성인: 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

【사용상 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 3) 심한 증상의 신부전 환자
 - 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 2) 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 4) 신장장애 환자
 - 5) 저단백혈증 환자
 - 6) 임부
 - 7) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

8) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께사용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 7) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
- 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 60캡슐, 120캡슐

【소비자 상담실】 02)834-2607

【반출 및 교환처】 구입처

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【판매처】 유한메디칼

서울시 영등포구 신길로 215

【제조원】 코스맥스바이오(주)
충청북도 제천시 바이오밸리3로 30

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여드립니다.

※ 본 제품은 공정거래위원회 소지 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 설명서 작성일자(2016년 12월)이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.