

【분류번호】 234

【원료약품 및 그 분량】 1정 중
산화마그네슘(MgO) 250mg

【성상】 성상은 흰색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 소화용 효과
- 1) 다음 질환의 재산작용 및 증상의 개선
위 십이지장염, 위염, 위산과다
- 2) 변비증

【용법·용량】

○ 성인

- 1) 위 십이지장염, 위염, 위산과다 : 산화마그네슘으로서 1일 0.5-1g을 수회(여러 차례) 분할 경구투여한다.(먹는다, 복용한다)

대한제약주식회사 국수성약물제조관리기준(KGMP)의 적용을 받음
41호백면지 14호약국 영업수준은 2030
2020. 2. 15. 제정된 제정된 판으로 41호
<http://www.dnpharm.co.kr>


DAE HWA
Magnesium Oxide Tab.

1000정

일반의약품

대한 **산화마그네슘** 정

제산 및 완하제



산화마그네슘

- 2) 변비증 : 1일 2g을 1-2회 분할 경구투여한다.
(먹는다, 복용한다)
다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의
모양과 상태를 보면서 조금씩 증량(양을
늘림) 또는 감량(줄임)한다.

【사용상의 주의사항】 내부문서 참조

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 1000정



제조번호 Q1108806456048212			
제조번호 사용기한	4mm	18mm	35mm
	6mm		
	8mm		

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 신장애(신장장애) 환자(심한 신기능장애 환자에서 고마그네슘혈증이 나타날 수 있다.)
 - 2) 설사 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 1) 심기능 장애 환자
 - 2) 고마그네슘혈증 환자
 - 3) 고령자(노인)(만 65세 이상)
3. 부작용
 - 1) 소화기계 : 때때로 설사 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 대사이상 : 장기 대량투여에 의하여 고마그네슘혈증이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 감량(줄임) 또는 휴약(복용(사용)중지) 등 적절한 처치를 한다.
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것
상당시 기능한한 이 첨부문서를 소지할 것
- 복용 후 다음 증상이 나타난 경우
 - 1) 순환기 : 일어섰을때 느끼는 현기증, 맥이 느려짐
 - 2) 정신신경계 : 강한 졸음, 의식이 희미해짐
 - 3) 기타 : 숨막힘, 근력저하, 구강건조, 구토

5. 일반적 주의
마그네슘 중독증상이 나타나면 칼륨염을 주사한다.
6. 상호작용
 - 1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용(함께 복용(사용)) 투여하지 않는다.
 - 2) 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 체액의 pH 상승에 의해 병용 약물의 흡수, 배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여한다.
 - 3) 다량의 우유, 칼슘제제와 병용시 우유 알칼리 증후군(고칼슘혈증, 고질소혈증, 알칼리증 등)이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
7. 저장상의 주의사항(갑상선)
공기 중에서 습기 또는 CO₂를 흡수하므로 보관에 주의한다.

※ 본 제품은 "국수성약물 제조 및 품질관리기준(KGMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입한 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 기타 자세한 사항이나 작성일자(2016년 12월 08일) 이후 변경된 내용은 대체제의 홈페이지(지니 마케팅팅(080-856-0114))으로 문의하시기 바랍니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

첨부문서 개정일 : 2016년 12월 08일