

090717

임산부를 위한 종합영양제

헤로바[®]맘스케어정

【제품정보】

- 1) 폴산(엽산), 철분, 각종 비타민, 미네랄 등을 골고루 함유하여, 임신전부터 임신, 수유기까지 하루 한알로 간편하게 복용할 수 있습니다.
- 2) 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료와 육체피로, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 노년기에 필요한 비타민 보급에도 효과적입니다.

【원료약품 및 그 분량】이 약 1정 중

유효성분 :

폴산(KP)	0.5mg
티아민질산염(KP)	1.6mg
리보플라빈(KP)	1.8mg
니코틴아미드(KP)	19mg
파리독신염산염(KP)	2.6mg
아스코르브산(KP)	100mg
비오틴(USP)	0.2mg
시아노코발라민1000배산(KP)	4mg
(시아노코발라민으로서 4μg)	
판토텐산칼슘(KP)	10mg
토코페롤아세테이트2배산(KP)	30mg
(비타민E로서 15IU)	
무수인산수소칼슘(USP)	336.62mg
(인으로서 76.63mg, 칼슘으로서 99.16mg)	
황산망간(USP)	2.31mg
(망간으로서 0.75mg)	
황산아연(USP)	11.4mg
(아연으로서 4.15mg)	
셀레늄함유간조효모(KP)	13.89mg
(셀레늄으로서 7.5μg)	
폴리사카리드철착염(KP)	63.05mg
(철로서 29mg)	
첨가제 : 글리콜산전분나트륨, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이틴색(03B28796), 오파드라이200 노란색(200F620009), 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 코포비돈	

【성상】

노란색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

다음 경우의 비타민 B1, B2, B6, C, E의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 노년기

철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

【용법·용량】

만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회 1정 복용

【사용상의 주의사항】

1. 경고

- 1) 철 함유제제는 만 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 시망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 혈액소증(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이차)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
- 5) 신장결석 환자
- 6) 심한 증상의 신부전 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자

8) 감심배당체를 투여 중인 환자

9) 담낭(쓸개)관련 질환, 간질환 환자

10) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

- 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 두드러기, 가려움, 광선과민반응, 복부·위통증, 경련, 열, 혼수, 피부염, 땀·호흡시 악취, 말모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 폐부종

2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.

3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.

4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.

5) 파리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.

6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.

7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체 의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

9) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.

10) 함알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.

11) 우발적으로 과량복용 한 경우

12) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】

30정(6정/PTPX5), 60정(6정/PTPX10)

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr>) → 의약품유해사례보고에 알리도록 하십시오.

※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보 참조

※ 만일, 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.

제조·판매
부광약품주식회사
경기도 안산시 단원구 능안로 47

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통화료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

♣ 소비자 상담실 : TEL 080-933-2233 <http://www.bukwang.co.kr>

※ 이 첨부문서 작성일자(2017년 09월 07일) 이후에 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.