

온 가족이 함께하는 광범위 구충제

알벤다 정 (알벤다졸)

1정

일반의약품

분류번호 : 642

[원료약품 및 분량] 1정 중 알벤다졸(USP) 400 mg
첨가제(타르색소) : 황색5호, 첨가제(동물유래성분) : 유당(젖당)수화물(소, 우유)



1회 요법 구충제

씩어서 복용하시면 더욱 좋습니다.

[효능 · 효과] 회충, 요충, 십이지장충, 편충, 아메리카 구충,
분선충의 감염 및 이들 혼합감염의 치료



일양약품



제조번호 : 1601 / 사용기한 : 2019. 12. 18.

[성상] 연한 주황색의 장판형 필름코팅정제 [용법 · 용량] 1. 성인 및 2세 이상의 유 · 소아 1 회충, 요충, 십이지장충, 편충, 아메리카 구충 : 400mg을 1회 복용한다. 2세 이상의 유 · 소아의 요충증은, 200mg을 1회 복용하고 7일 후 200mg을 반복 복용할 수 있다. 2. 분선충 : 1일 1회 400mg을 3일간 복용한다. 3. 편충의 중증 혼합 감염시 : 1일 1회 400mg을 3일간 복용한다. * 씹거나 소량의 물로 복용할 수 있으며 식사와 중간의 중증 혼합 감염시 : 1일 1회 400mg을 3일간 복용한다. * 치료 3주 후 검사를 하여 치료되지 않았으면 하거나 해체설사약을 쓰는 등의 특별한 과정은 필요없다. * 치료 3주 후 검사를 하여 치료되지 않았으면 경우에 따라 2회 복용을 실시할 수 있다. [사용상의 주의사항] 1. 경고 : 약에 함유되어 있는 연료감각제와 아스파탐은 제산제에 분해되어 메틸글루타미르로 대사되므로, 메틸글루타미르의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 메틸글루타미르 환자에게는 투여를 제한할 것. * 1일 허용량제한 - 아스파탐 함유량 WHO 권고량 (40mg/kg)을 일일 허용 가능한 최소량 사용량(2g) - 60mg 성인 : 1일 최대복용량 2.4g 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 이 약 및 이 약 구성 성분에 과민반응 환자 2) 임부 3) 2세 미만의 영아 (맛약) 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것 : 이 약은 황색5호(타르색소)인 FCF, Sunset Yellow FCF를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 테오필린 : 테오필린의 대사를 억제할 수 있다. 5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사 및 약사와 상의할 것 : 이 약에 모유로 이행되는지에 관해서는 알려지지 않았으나, 이 약 복용 시에는 수유를 중단하는 것이 좋다. 6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 이 처방문서를 소지할 것. 1) 피부발진(만성우루곤/스티븐스-존슨증후군, 다형성비만(여러모양의 붉은 반점)이 나타날 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 실시한다. 2) 구역, 구토, 속쓰림, 설사, 심해부 또는 복부(배부) 통증 등의 위장관 장애 또는 두통 및 어지러움이 나타날 수 있다. 3) 드물게 발열, 발진, 전신 발적증상등이 나타날 수 있다. 4) 가려움, 두드러기 등이 나타나는 보고가 있다. 5) 가려움, 두드러기 등 나타날 수 있다. 7. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항 1) 이 약 사용 전에는 반드시 임신 중이 아님을 확인한 후에 사용할 것. 임신 초기 동안에 이 약의 투여를 피하기 위해서 가임연령의 여성은 성관계를 할 때 피임약 또는 임신 테스트에서 양성인 후 나타날 후에 치료를 시작할 것. 2) 분선충사이에의 영향 : 때때로 가려움(가려움)을 유발할 수 있다. 3) 프라지퀀텔이 알벤다졸을 분해하여 활성도를 증가시킨다는 보고가 있다. 4) 과량투여했을 경우 대증요법(제제) 및 일반적인 지지 요법을 사용한다. 8. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선의 파하여 건조한 건조하고 시원한 곳에 실온 보관할 것. 3) 오 · 남용을 피하고, 궁극적으로 오 · 유치하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것. [저장방법] 밀폐용기, 실온(15~30℃) 보관

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 지났거나 변질 · 변색 · 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. * 사용유형(가)에 대한 의약품 사용하지 않습니다. * 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관 (http://kugmug.korea.go.kr)에서 확인할 수 있습니다. * 작성일 : 2016. 11. 25. Rev. 01 * 소비자상담실 : 031-682-2900

[(주)레고켈제약] [제조지] (한국)파라세약 / 경기도 안성시 단원구 산단로83번길 127
경기도 안성시 원곡면 원당로 354